

תרופות שעלולות לגרום ל - Idiopathic intracranial hypertension (Pseudotumor Cerebri)

תסמונת המתבטאת ביתר לחץ תוך גולגולתי ויכולה להיגרם ע"י סיבות רבות, ביניהן תרופות, קריש דם, סרטן מוח ולעיתים ללא סיבה נראית לעין. התסמונת פוגעת בכל טווח הגילאים, אך שכיחה יותר בקרב ילדים ונשים צעירות בגיל הפוריות. שכיחות המחלה באוכלוסייה הכללית הינה 1: 100,000.

סימפטומים של עלייה בלחץ תוך גולגולתי:

1. כאב ראש (מופיע בלמעלה מ-70% מהמקרים)
2. פפילאדמה - בצקת של ראש עצב הראייה (optic disc) בעין, בד"כ דו צדדי. אפשר להבחין בבצקת בבדיקת orbit ultrasonography.
3. ראייה כפולה (דיפלופיה) מדווחת ב- 40% מהמקרים.
4. טיניטוס (זמזום) סימפטום שכיח המופיע ב-60% מהחולים.

קשר המבוסס על דיווחי מקרה ממספר מקורות מידע	
Vitamin A (hypervitaminosis A, severe vitamin A deficiency)	Isotretinoin
Combined oral contraceptives	Levothyroxine
Corticosteroids use (especially with prednisone) and withdrawal	Lithium
Cyclosporine	Nitrofurantoin
Growth Hormones	Tetracyclines (especially with Minocycline and Doxylin)

קשר אפשרי		
Amiodarone	Fluoroquinolones	Phenytoin
Cytarabine	Indomethacin	Sulfonamide

התרופות המופיעות ברשימה הנ"ל, הן רק תרופות הרשומות בישראל ושהינן בשימוש נפוץ.

1. Robert M. Kliegman.et.al. Nelson Textbook of PEDIATRICS. 19th Edition. 2011. 597: 2099- 2101.
2. Idiopathic intracranial Hypertension. AAO BCSC Neuro-ophthalmology 2013-2014 Chapter 4. The Patient with Decreased Vision: Classification and Management.
3. Micromedex® 2.0, 2017.

