

בעריכת מגר' ברכה שטהל, מנהלת המרכז למידע תרופתי, מרכז רפואי רבין

לתלות בבית המרקחת

שם מסחרי	שם גנרי	צורת מינון	חלופה תרופוטית אפשרית
Abitren	Diclofenac Sodium	EC=25mg SR=100mg	Ibufen, Artofen, Naxyn, Naproxi
Adizem CD	Diltiazem	SR	Levodex, Dilatam 60mg
Betaren	Diclofenac Sodium	EC=25mg SR=100mg	Ibufen, Artofen Naxyn, Naproxi
Bezalip Retard	Bezafibrate	SR	Norlip 200mg
Bricalin Durules	Terbutaline	SR	Ventolin Tab
Cartia	Aspirin	EC	Acetosal 300mg *
Controloc	Pantoprazole	EC	Losec ** ראה הוראות
Cordil 40 SR	Isosorbide Dinitrate	SR	Cordil 20mg
Depalept	Sodium Valproate	EC	Depalept solution, syrup
Diamox 500	Acetazolamide	SR	Uramox 250mg
Dilatam 120 SR	Diltiazem	SR	Levodex, Dilatam 60mg
Dilatam 240 CD	Diltiazem	SR	Levodex, Dilatam 60mg
Ecoprin	Aspirin	EC	Acetosal 300mg
Eryc	Erythromycin	EC	Erythro-Teva
Ikapress	Verapamil	SR	Veracor, Ikacor 80mg
Isotard	Isosorbide Dinitrate	SR	Cordil 20mg
Laxadin	Bisacodyl	EC	Laxative Comp.
Lopressor Divitabs	Metoprolol	SR	Neobloc 100mg
Lopressor OROS	Metoprolol	SR	Neobloc 100mg
Losec	Omeprazole	EC	Losec ** ראה הוראות
Metopress Retard	Metoprolol	SR	Neobloc 100mg
Monocord 50 SR	Isosorbide Mononitrate	SR	Monocord 20,40
Monolong	Isosorbide Mononitrate	SR	Monocord 20,40
Mononit 50 SR	Isosorbide Mononitrate	SR	Mononit 20,40
Neobloc Longitabs	Metoprolol	SR	Neobloc 100mg
Omepradex	Omeprazole	EC	Losec ** ראה הוראות
Osmo-Adalat	Nifedipine	SR	Norvasc
Oxopurin	Pentoxifylline	EC	----
Oxy Contin	Oxycodone	SR	Oxycod syrup
Penedil	Felodipine	SR	Norvasc
Pressolat	Nifedipine	SR	Norvasc
Premaril	Conjugated Estrogens	EC	Estraderm patch
Quniduran	Quinidine	SR	Quinidine Sulphate
Ritopar Retard	Ritodrine	SR	Ritopar
Salazopyrin EN	Sulfasalazine	EC	Salazopyrin
Sinemet CR	Levodopa + Carbidopa	SR	Dopicar
Slow Deralin	Propranolol	SR	Deralin 40
Slow Fe	Ferrous Sulphate	SR	Ferripel syrup
Slow K	Potassium Chloride	SR	KCl solution
Tevacor SR	Oxprenolol	SR	Tevacor 20mg
Tegretol CR	Carbamazepine	SR	Tegretol
Theotard	Theophylline	SR	Glyphyllin
Theotrim	Theophylline	SR	Glyphyllin
Trasicor SR	Oxprenolol	SR	Tevacor 20mg
Trental	Pentoxifylline	EC	---
Verapress	Verapamil	SR	Veracor, Ikacor
Voltaren	Diclofenac	EC = 25mg SR = 100mg	Ibufen, Artofen, Naxyn, Naproxi
Zoton	Lansoprazole	EC	Losec ** ראה הוראות

טכנולוגיות חדשות בענף הרוקחות איפשרו פיתוח פורמולציות של תרופות המאפשרות שיחרור מבוקר של החומר הפעיל במקום ובזמן הרצויים:

EC - תרופות המופיעות עם ציפוי Enteric Coated (EC) אמורות להתפרק במעי ולא בקיבה. ריסוק עלול לשחרר מהר מדי את התרופה ולגרום לעיתים לפגיעה בקיבה ו/או לאובדן הפעילות הרפואית הרצויה. **SR** - תרופות המופיעות בצורת מינון של שחרור מושהה (SR) Sustained Release (SR) אמורות לפעול במשך שעות רבות לאחר המתן, ע"י שחרור איטי של החומר הפעיל. ריסוק עלול לגרום לשחרור מיידי של כל החומר הפעיל ולהשפעה טוקסית.

חשוב מאוד להקפיד ולהנחות את החולה לא לרסק תרופות המופיעות בשימה זו.

מתן טבליות מרוסקות או תכולת כמוסות באמצעות צינור הזנה (זונדה), עלול לגרום להידבקות חלקיקים ואגרזיה העלולים לסתום את הצינורית. מומלץ להרחיף את התרופה במים ולשטוף את הצינורית לפני ואחרי הכנסת התרופה עם 30 מ"ל מים מזוקקים.

הערות: * Acetosal - המינון הנמוך הקיים בשוק - 300mg ** הגרנולות סותמות את הזונדה לכן יש להכין תמיסה בהתאם להוראות.

הוראות למתן LOSEC ו-ZOTON בזונדה ובתרחיף
Omeprazole וכן Lansoprazole מתפרקים במהירות בסביבה החומצית של הקיבה ומאבדים מייעילותם, לכן הוכנו הכמוסות ומגרגרים המצופים בציפוי אנטרי, המסיס רק בסביבה הבסיסית של המעי. מסיבה זו אסור לרסק את תכולת הכמוסות.

הוראות למתן Losec ו-Zoton בזונדה:

1. הוצא בוכנה ממזרק של 20 מ"ל.
2. פתח כמוסה והכנס את תכולתה למזרק. הכנס חזרה את הבוכנה.
3. הוסף למזרק 10 מ"ל sodium bicarbonate 8.4%.
4. נער את המזרק בעדינות (יתכן שחרור CO2). המתן 10-30 דקות עד לקבלת תרחיף הלבן אחיד.
5. הזרק לתוך הזונדה 10 מ"ל sodium bicarbonate 8.4% להעלאת PH הקיבה.
6. הזרק את התרחיף שהכנת לתוך הזונדה תוך פחות מ-5 דקות מאז ההזרקה של ה-bicarbonate.
7. שטוף המזרק והזונדה בעזרת 20 מ"ל מים.
8. הערה: ניתן לבצע שלב 3 עם 2.5 מ"ל sodium bicarbonate 8.4% + 2.5 מ"ל מים להזרקה.

מתן תרחיף Losec או Zoton:

9. לחולים המתקשים בבליעת הכמוסה, ניתן לפתוח את הכמוסה ולהרחיף את תוכנה (גרגרים מצופים בציפוי אנטרי) בתמיסה חומצית כמו מיץ תפוחים, מיץ תפוחים או יוגורט (לא בחלב). על החולה לשתות את התרחיף מיד לאחר הכנתו.