

## תרופות הגורמות לעליה בלחץ דם (המשך)

| התרופה\קב' פרמקולוגית  | השימוש                       | הערות  |
|--|------------------------------|--|
| <b>Immunosuppressives</b>  |                              |  |
| Cyclosporine, Tacrolimus, Sirolimus, Mycophenolate Mofetil   | לדיכוי חיסוני                | תלוי במינון  |
| <b>Psychotropic Agents</b>   |                              |  |
| <b>Monoamine Oxidase Inhibitors (MAOI)</b>   |                              |  |
| Phenelzine, Tranylcypromine, Moclobemide, [Selegiline, Procarbazine*]  | לדיכאון                      | בעיקר בשימוש עם חומרים סימפטומימיטיים או מזון המכיל טירמין<br>* אינם משמשים בפסיכיאטריה  |
| <b>Tricyclic Antidepressants</b>   |                              |  |
| Amitriptyline, Imipramine, Clomipramine  | לדיכאון                      | בעיקר בחולים עם Panic Disorders  |
| <b>SNRI, NRI SSRI</b>  |                              |  |
| Fluoxetine, Sertraline, Venlafaxine, Reboxetine  | לדיכאון                      | כל התרופות בקבוצה זו, עלולות לגרום לעלייה בל"ד כאשר ניתנות בשילוב עם תרופות הגורמות ל-serotonin syndrome                           |
| Lithium  | פסיכוחה מניה-דפרסיבית        | הרעלה יכולה לגרום ליתר לחץ דם חמור   |
| Clozapine  | פסיכוחה                      | תוארו מקרים של פסאודופאוכרומוציטומה  |
| Thioridazine   |                              | מינון יתר יכול לגרום ליתר לחץ דם חמור  |
| <b>Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs)</b>   |                              |  |
| בעיקר:<br>Indomethacin Piroxicam, Naproxen<br>תרופות נוספות בקבוצה: Diclofenac, Ibuprofen, Etodolac, etc.<br>מעכבי Cox-2 כגון Celecoxib, Rofecoxib | נוגדי דלקת ולהרגעת כאבים     | * יכולים לגרום לעליה בלחץ דם ולנטרל טיפול אנטי-היפרטנסיבי. המנגנון אינו ברור לגמרי<br>* מינון נמוך של אספירין אינו משפיע על לחץ דם |
| <b>שונות</b>   |                              |  |
| Bromocriptine  | הפסקת הנקה, פרולקטינומה      | דווח על משבר היפרטנסיבי לאחר לידה לכן נאסר לשימוש כמדכא הפרשת חלב לאחר הלידה   |
| Ritodrine Hydrochloride  | לעיכוב לידה מוקדמת           | דווח על משבר היפרטנסיבי  |
| Sibutramine (Reductil)   | להרזיה                       |  |
| Yohimbine Hydrochloride  | לאין אונות                   | עלייה חדה בלחץ דם התלוי במינון   |
| Amphotericin B   |                              | במתן תוך ורידי   |
| Glucagon   |                              | רק בחולי פאוכרומוציטומה  |
| Physostigmine  | לנטרול תופעות אנטיכולינרגיות |  |
| <b>Anti-Neoplastic Agents</b>  |                              |  |
| Cisplatin, Paclitaxel (Taxol)  | במחלות ממאירות               |  |
| Erythropoietin   | אנמיה בחולה אי ספיקת כליות   | תלוי במינון, דווח על משבר היפרטנסיבי   |
| Disulfiram   | אלכוהוליזם                   |  |
| Alcohol  | לשתייה                       |  |
| Nicotine   | עישון                        | עלייה חדה חולפת בלחץ דם  |
| Indinavir  | טיפול ב-AIDS                 |  |