

## תרופות הגורמות לעליה בלחץ דם (המשך)

התרופה\קב' פרמקולוגית	השימוש	הערות
<b>Immunosuppressives</b>		
Cyclosporine, Tacrolimus, Sirolimus, Mycophenolate Mofetil	לדיכוי חיסוני	תלוי במינון
<b>Psychotropic Agents</b>		
<b>Monoamine Oxidase Inhibitors (MAOI)</b>		
Phenelzine, Tranylcypromine, Moclobemide, [Selegiline, Procarbazine*]	לדיכאון	בעיקר בשימוש עם חומרים סימפטומימיטיים או מזון המכיל טירמין * אינם משמשים בפסיכיאטריה
<b>Tricyclic Antidepressants</b>		
Amitriptyline, Imipramine, Clomipramine	לדיכאון	בעיקר בחולים עם Panic Disorders
<b>SNRI, NRI SSRI</b>		
Fluoxetine, Sertraline, Venlafaxine, Reboxetine	לדיכאון	כל התרופות בקבוצה זו, עלולות לגרום לעלייה בל"ד כאשר ניתנות בשילוב עם תרופות הגורמות ל-serotonin syndrome
Lithium	פסיכוחה מניה-דפרסיבית	הרעלה יכולה לגרום ליתר לחץ דם חמור
Clozapine	פסיכוחה	תוארו מקרים של פסאודופאוכרומוציטומה
Thioridazine		מינון יתר יכול לגרום ליתר לחץ דם חמור
<b>Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs)</b>		
בעיקר: Indomethacin Piroxicam, Naproxen תרופות נוספות בקבוצה: Diclofenac, Ibuprofen, Etodolac, etc. מעכבי Cox-2 כגון Celecoxib, Rofecoxib	נוגדי דלקת ולהרגעת כאבים	* יכולים לגרום לעליה בלחץ דם ולנטרל טיפול אנטי-היפרטנסיבי. המנגנון אינו ברור לגמרי * מינון נמוך של אספירין אינו משפיע על לחץ דם
<b>שונות</b>		
Bromocriptine	הפסקת הנקה, פרולקטינומה	דווח על משבר היפרטנסיבי לאחר לידה לכן נאסר לשימוש כמדכא הפרשת חלב לאחר הלידה
Ritodrine Hydrochloride	לעיכוב לידה מוקדמת	דווח על משבר היפרטנסיבי
Sibutramine (Reductil)	להרזיה	
Yohimbine Hydrochloride	לאין אונות	עלייה חדה בלחץ דם התלוי במינון
Amphotericin B		במתן תוך ורידי
Glucagon		רק בחולי פאוכרומוציטומה
Physostigmine	לנטרול תופעות אנטיכולינרגיות	
<b>Anti-Neoplastic Agents</b>		
Cisplatin, Paclitaxel (Taxol)	במחלות ממאירות	
Erythropoietin	אנמיה בחולה אי ספיקת כליות	תלוי במינון, דווח על משבר היפרטנסיבי
Disulfiram	אלכוהוליזם	
Alcohol	לשתייה	
Nicotine	עישון	עלייה חדה חולפת בלחץ דם
Indinavir	טיפול ב-AIDS	