



EXELON[®] PATCH

(rivastigmine transdermal system)

מדבקות אקסלון לטיפול בחולי אלצהיימר בדרגה Mild to Moderate

- החומר הפעיל במדבקה Rivastigmine מספק יתרון על פני דונפזיל כפי שנמדד במבחן ⁵.ADCS-ADL. החומר הפעיל Rivastigmine הוא היחיד מבין החומרים שנמצאים בשימוש נרחב אשר מעכב הן של BuChE והן של AChE¹.
- הגעה למינון תרפויטי אופטימלי ב- 95% מהחולים ומתן רציף של התרופה במשך 24 שעות.^{1,4}
- נוחות במתן התרופה, פעם ביום ללא קשר לאוכל, יתרון לחולה אשר אינו רוצה או מסוגל לבלוע קפסולות ויתרון למטפל אשר יכול להיות בטוח שהתרופה נלקחה.²
- סבילות טובה בשל ירידה של פי שלושה בתופעות הלוואי של מערכת העיכול בהשוואה לטיפול בקפסולות.^{1,4}

למדבקות אקסלון שני מינונים⁶


יש לרשום במרשם	גודל מדבקה	חומר פעיל (כפי שמופיע במחשב)	קצב שחרור החומר הפעיל
Exelon [®] Patch 9 mg/5 cm ²	5 cm ²	Rivastigmine 9 mg	4.6 מ"ג ב- 24 שעות
Exelon [®] Patch 18 mg/10 cm ²	10 cm ²	Rivastigmine 18 mg	9.5 מ"ג ב- 24 שעות



כל מדבקה טרנסדרמלית של 5 סמ"ר מכילה:
Each transdermal patch of 5 cm² contains:
Rivastigmine 9 mg
קצב השחרור: 4.6 mg / 24 hours

כל מדבקה טרנסדרמלית של 10 סמ"ר מכילה:
Each transdermal patch of 10 cm² contains:
Rivastigmine 18 mg
קצב השחרור: 9.5 mg / 24 hours

כיצד להתחיל טיפול במדבקה?⁶



במידה והחולה מקבל דונפזיל, יש להתחיל במדבקות אקסלון 5 ס"מ² (9 מ"ג Rivastigmine) ולאחר ארבעה שבועות להעלות את המינון למדבקות 10 ס"מ² (18 מ"ג Rivastigmine)³

כיצד יש להנחות את המשתמש במדבקה:^{1,6}

- יש לציין בפני המטפל כי יש להדביק מדבקה אחת בלבד
- את המדבקה יש להדביק על עור נקי, יבש, ללא שיער וללא חתכים או גירויים
- ניתן להדביק על אזור הגב העליון או התחתון, בחלק העליון של הזרוע או על החזה
- יש לשנות את מיקום המדבקה בכל הדבקה. אין לחזור על אותו מיקום במשך שבוע
- ניתן להשאיר את המדבקה בזמן רחצה. מזג אוויר חם אינו משפיע על סבילות העור למדבקה

References:

- Winblad B, Cummings J, Andreasen N, et al. A six-month double-blind, randomized, placebo-controlled study of transdermal patch in Alzheimer's disease - rivastigmine patch versus capsule. *Int J Geriatr Psychiatry* 2007;22(5):456-467
- Winblad B, Kawata AK, Beusterien KM, et al. Caregiver preference for rivastigmine patch relative to capsules for the treatment of probable Alzheimer's disease. *Int J Geriatr Psychiatry* 2007;22(5):485-491
- Sadowsky C, Dengiz A, Olin JT, et al. Switching from Donepezil Tablets to Rivastigmine Transdermal Patch in Alzheimer's disease. *AM J Alzheimer's Disease & Other Dementias* 2009
- Darreh - Shori T and Jelic V. Safety and Tolerability of transdermal and oral rivastigmine in Alzheimer's disease and Parkinson's disease dementia. *Expert Opinion Drug Safety* 2010, 9(1) 167-176
- Bullock R, Touchon J, Bergman H. et al. Rivastigmine and donepezil treatment in moderate to moderately - severe Alzheimer's disease over a 2 year period. *Curr Med Res Opin.* 2005; 21(8);1317-1327
- עלון לרופא כפי שאושר על ידי משרד הבריאות הישראלי

רופא/ה נכבד/ה, יש לעיין בעלון לרופא כפי שאושר ע"י משרד הבריאות הישראלי