עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים
(תכשירים) התשמ"ו – 1986

בטאקורטן G

קרם/משחה

לטיפול מקומי בדלקות ואלרגיות של העור המלוות בזיהום

תרופה זו חייבת במרשם רופא

קרא/י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה

הרכב: החומרים הפעילים: Betamethasone (as 17-valerate) 0.1%
Gentamycin (as sulphate) 0.1%

מרכיבים בלתי פעילים:

קרם: Liquid paraffin, cetostearyl alcohol, macrogol cetostearyl ether, chlorocresol, sodium acid phosphate, phosphoric acid, purified water
משחה: Liquid paraffin, white soft paraffin

קבוצה תרפויטית:
Betamethasone - קורטיקוסטרואיד פוטנטי.
Gentamycin - חומר אנטיביוטי ממשפחת האמינוגליקוזידים.

פעילות רפואית:
לטיפול מקומי בדלקות ואלרגיות של העור המלוות בזיהום.

מתי אין להשתמש בתכשיר?

אין להשתמש בתכשיר כאשר הינך בהריון בשליש ראשון.
אין להשתמש בתכשיר אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה.
אין להשתמש בתכשיר אם הינך סובל/ת מזיהום נגיפי (שלבקת/הרפס, אבעבועות רוח), חיידקי (שחפת של העור) ו/או פטרייתי של העור.
במחלות עור כגון אקנה ורוזצאה (אודם חמור של עור הפנים).
אין להשתמש בתכשיר על רקמות ריריות (פי הטבעת, איברי המין, מסביב לפה/לאף).
תרופה זו אינה מיועדת לתינוקות מתחת לגיל שנה.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:

אם הינך בהריון או מניקה. אם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד הכבד, הכליה או מערכת החיסון.
אם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מסוכרת, מגלאוקומה או קטרקט.
אזהרות: אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, במיוחד לחומרים אנטיביוטיים, עליך להודיע על-כך לרופא לפני השימוש בתרופה. כאשר משתמשים בתכשיר תקופה ממושכת או לעיתים קרובות יש להיוועץ ברופא. אין להשתמש בתרופה זו על שטחי עור נרחבים או פצעים פתוחים או מזוהמים. שימוש ממושך על עור הפנים אינו מומלץ. זהירות מיוחדת נדרשת בשימוש בילדים ובמתבגרים. השימוש בגילאים אלו חייב להיות מלווה במעקב רפואי. אין להשתמש למטרה שונה מזו שלשמה נרשם התכשיר. יש להקפיד ולהיזהר ממגע התרופה עם העיניים. במקרה של מגע בעיניים יש לשטוף אותן היטב במים. לעיתים שימוש באנטיביוטיקות לטיפול מקומי מעודד צמיחה של מיקרואורגניזמים נוספים, בכללם פטריות. אם זיהית זיהום פטרייתי או אם מתפתח גירוי בעקבות השימוש בתכשיר, המכיל גנטמיצין, יש להפסיק את הטיפול בתרופה ולהחליפו בטיפול מתאים אחר.
תגובות בין-תרופתיות: אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, כולל תרופות הנמכרות ללא מרשם, או אם גמרת זה עתה טיפול בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות, במיוחד אם הינך משתמש/ת בתכשיר/ים אחר/ים לשימוש חיצוני.
תופעות לוואי: בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות לוואי מקומיות, כגון: הרגשת חום ועקצוץ, גירוי וגרד. תופעות אלו חולפות בדרך כלל תוך זמן קצר לאחר תקופת הסתגלות לתכשיר. אך במידה שהן אינן חולפות, או אם חל בעור שינוי אחר לרעה, יש להפסיק את הטיפול ולפנות לרופא.
תופעות לוואי המחייבות התייחסות מיוחדת:
רגישות יתר (פריחה, אדמומיות, הרעת המצב, התנפחות), נדיר: יש להפסיק את הטיפול ולפנות לרופא!
התפתחות זיהום, נדיר: יש להפסיק את הטיפול ולפנות לרופא!
התופעות שלהלן נדירות אך שכיחות יותר בילדים ותינוקות: צמיחת שיער מוגברת, עלייה בלחץ הדם, עלייה במשקל, נפיחות בפנים, פנים מתעגלות, דילול העור, פיגמנטציה של העור: כל אחד ממקרים אלו מחייב פנייה מיידית לרופא לצורך הפסקת טיפול תחת השגחה רפואית.
בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד.
תופעות לוואי ותגובות בין-תרופתיות בילדים ותינוקות:
על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד/ה! ראה/י לעיל תופעות לוואי מיוחדות שפורטו.
מינון מקובל: מינון לפי הוראות הרופא בלבד.
אין לעבור על תדירות ומשך הטיפול המומלץ.
בהיעדר הוראה אחרת מהרופא: יש לנקות את האזור המטופל לפני השימוש. ביידיים נקיות יש למרוח בעדינות, פעם עד פעמיים ביום, כמות קטנה של הקרם/משחה על המקום הנגוע עד לספיגה מלאה. עם השיפור ניתן להפחית את מספר המריחות לפעם אחת ביום או לעיתים תכופות פחות.
אין לטפל בתכשיר על עור הפנים לתקופה העולה על 5 ימים, אלא אם הותווה אחרת על-ידי הרופא.
השימוש במשחה מומלץ למקרים של עור יבש בהם החדירה קשה.
השימוש בקרם מומלץ באזורים רטובים מפרישים ובאזורים שבהם מעוניינים בשטיפה נוחה של המקום.
במידה ולא הותווה אחרת על-ידי הרופא, יש להימנע מחבישה אוטמת באזור הנגוע (חיתולים חד פעמיים לתינוק מהווים חבישה אוטמת).
אם לא חל שיפור במצבך תוך שבוע ימים יש לפנות לרופא שנית.
מינון לילדים: אלא אם הותווה אחרת על-ידי הרופא, אין לטפל בתכשיר בתינוקות וילדים יותר מ- 5 ימים בפרט לא באזורים המכוסים על-ידי חיתולים.
תרופה זו אינה מיועדת לתינוקות מתחת לגיל שנה.
שים/י לב: לא לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.
יש להימנע ממגע עם העיניים, רקמות ריריות ובאזור הפה. במקרה של מגע יש לשטוף היטב במים.
כיצד תוכל/י לסייע להצלחת הטיפול?
עליך להשלים את הטיפול שהומלץ לך על-ידי הרופא.
גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם רופא.
מנע/י הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע/י הרעלה.
אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה/י מיד לחדר מיון של בית-חולים, והבא/י אריזת התרופה איתך.
אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא! תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך, בחולה אחר/ת היא עלולה להזיק. **אל תיתן/י תרופה זו לקרוביך, שכניך או מכריך.**
אין ליטול תרופות בחושך! יש לבדוק את התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל/ת תרופה. יש להרכיב משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.
אחסנה: במקום קריר, מתחת ל- 25°C. אין להקפיא.
גם לפי תנאי האריזה/האחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.
אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס' רישום התרופה: **בטאקורטן G קרם:** 050.42.23259.00
בטאקורטן G משחה: 050.45.23262.00

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על-ידו

תריסה
מעברות 40230
תוצרי רפואה ישראליים
מעברות בע"מ
0710C

106128110

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة
(مستحضرات) ١٩٨٦

بيتاكورتين G

كريم/مرهم

للعلاج الموضعي في إلتهابات وتحسسات الجلد والتي يصاحبها تلوث

هذا الدواء ملزم بوصفة طبيب

إقرأ/ي النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء

التركيب: المواد الفعالة: Betamethasone (as 17-valerate) 0.1%
Gentamycin (as sulphate) 0.1%

المواد غير الفعالة:

كريم: Liquid paraffin, cetostearyl alcohol, macrogol cetostearyl ether, chlorocresol, sodium acid phosphate, phosphoric acid, purified water
مرهم: Liquid paraffin, white soft paraffin

الفصيلة العلاجية:
بيتاميتازون ـ كورتيكوستيروئيد فعّال.
جنتاميسين ـ مضاد حيوي من فصيلة الأمينوجليكوزيدات.

تأثيرات الدواء الطبية:
للعلاج الموضعي في إلتهابات وتحسسات الجلد التي يصاحبها تلوث.

متى لا يجوز لك إستعمال المستحضر؟

لا يجوز إستعمال هذا المستحضر عندما تكونين في الثلث الأول من الحمل.
لا يجوز إستعمال هذا المستحضر إذا وجدت حساسية لأحد مركباته.
لا يجوز إستعمال هذا المستحضر إذا كنت تعاني/ن من تلوث جلد ڤيروسي (العقبولة/هربس، جدري الماء)، جرثومي (سل الجلد) و/أو فطري.
أمراض جلدية مثل حب الشباب والعد الوردي (إحمرار شديد لجلد الوجه).
لا يجوز إستعمال المستحضر على الأنسجة المخاطية (فتحة الشرج، الأعضاء التناسلية، حول الفم/الأنف).
هذا الدواء غير مخصص للإستعمال لدى الرضع دون سنة من العمر.

لا يجوز لك إستعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب مقدماً:

عندما تكونين في فترة الحمل أو في فترة الرضاعة. إذا كنت تعاني/ن أو إذا عانيت في الماضي من خلل في وظيفة الكبد، الكلى أو جهاز المناعة.
إذا كنت تعاني/ن أو إذا عانيت في الماضي من السكري، من الچلوكوما أو كاتاراكت.

تحذيرات: يجب إبلاغ الطبيب عن أي حساسية لديك لطعام أو عقاقير خاصة المضادات الحيوية قبل إستعمالك للدواء. عندما يستعمل المستحضر لفترة طويلة أو لفترات متقاربة، يجب إستشارة الطبيب. لا يجوز إستعمال هذا الدواء على مساحات واسعة من الجلد أو على جروح مفتوحة أو ملوثة. إن الإستعمال المطول على جلد الوجه غير موصى به. إن إستعمال هذا الدواء لدى الأطفال والمراهقين يتطلب إتخاذ الحذر بشكل خاص. كما أن إستعمال هذا الدواء لدى هذه الفئة من الأعمار يجب أن يتم تحت إشراف طبي. لا يجوز إستعمال المستحضر لهدف مغاير لما وصف له.
يجب الحرص والحذر من تماس الدواء بالعينين، وإن حصل ذلك خطأ يجب شطفهما جيداً بالماء. أحياناً إن إستعمال المضادات الحيوية للعلاج الموضعي يشجع نمو كائنات مجهرية أخرى، بما في ذلك الفطريات. إذا شخصت تلوث فطري أو إذا تطور تهيج جراء إستعمال المستحضر الذي يحتوي جنتاميسين، يجب التوقف عن العلاج بالدواء وإستبداله بعلاج آخر مناسب.

التفاعلات بين الأدوية: إذا كنت تتعاطى/ن دواءً إضافياً، بما في ذلك أدوية تصرف بدون وصفة طبية أو إذا أنهيت العلاج الآن بدواء آخر، فيجب إعلام الطبيب المعالج، وذلك لتفادي الأخطار أو عدم النجاعة الناتجة عن التفاعلات بين العقاقير، خاصة إذا كنت تستعمل/ين مستحضرات أخرى للإستعمال الخارجي.

الأعراض الجانبية: إضافة إلى التأثيرات الطبية المرغوبة للدواء، فقد تظهر أثناء فترة إستعماله بعض الأعراض الجانبية الموضعية، مثل: الشعور بالسخونة والوخز، تهيج وحكة. تختفي هذه الأعراض عادة خلال فترة قصيرة بعد أن يعتاد الجسم على الدواء. أما إذا لم تختف هذه الأعراض أو إذا حصل تغير آخر للأسوأ في الجلد، يجب التوقف عن العلاج ومراجعة الطبيب.

PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH
THE PHARMACISTS' REGULATIONS (PREPARATIONS) - 1986

BETACORTEN G

Cream/Ointment

For the local treatment of inflammatory and allergic skin conditions accompanied by infections

The dispensing of this medicine requires a doctor's prescription

Read this package insert carefully in its entirety before using this medicine

Composition: Active ingredients:
Betamethasone (as 17-valerate) 0.1%
Gentamycin (as sulphate) 0.1%

Inactive ingredients:
Cream: Liquid paraffin, cetostearyl alcohol, macrogol cetostearyl ether, chlorocresol, sodium acid phosphate, phosphoric acid, purified water
Ointment: Liquid paraffin, white soft paraffin

Therapeutic group: Betamethasone - Potent corticosteroid.
Gentamycin - Aminoglycozide antibiotic agent.

Therapeutic activity: For the local treatment of inflammatory and allergic skin conditions accompanied by infections.

When should the preparation not be used?

Do not use this preparation during the first trimester of pregnancy.
Do not use this preparation if you have a known sensitivity to any of its ingredients. Do not use this preparation if you have a viral (shingles/herpes, chickenpox), bacterial (tuberculosis of the skin) and/or fungal infection of the skin. In skin diseases such as acne and rosacea (severe redness of the facial skin).
Do not use this preparation on mucosal tissue (the anus, genitals, around the mouth/nose). This medicine is not intended for use in infants under one year of age.

Do not use this medicine without consulting a doctor before starting treatment:

If you are pregnant or breastfeeding. If you are suffering, or have suffered in the past, from impaired function of: the liver, the kidney or the immune system. If you are suffering, or have suffered in the past, from diabetes, glaucoma or cataract.

Warnings: If you are sensitive to any type of food or medicine, especially antibiotics, inform your doctor before commencing treatment with this medicine. When using this medicine for a prolonged period of time or frequently, consult your doctor. Do not use this medicine on extensive skin areas, open or infected wounds. Prolonged use on facial skin is not recommended. Special care should be taken when used in children or adolescents. Use in these ages must be under medical supervision.
Do not use this medicine for any purpose other than that for which it was prescribed. Be sure to avoid contact of the medicine with the eyes. In case of contact with the eyes, rinse them well with water.
Sometimes use of antibiotics for local treatment promotes growth of other microorganisms, including fungi. If a fungal infection has been identified or if an irritation developed due to the use of the preparation which contains gentamycin, stop treatment with this medicine and replace it with another appropriate treatment.

Drug interactions: If you are taking another drug, including non-prescription medicines, or if you have just finished treatment with another medicine, inform the attending doctor in order to prevent hazards or lack of efficacy arising from drug interactions, especially if you are using another/other preparation/s for external use.

Side effects: In addition to the desired effect of the medicine, local adverse effects may occur during treatment with this medicine, for example: feeling of warmth and stinging, irritation and itching. These side effects usually disappear within a short time following the adaptation period to the medicine. However, if they do not disappear or if there is another change for the worse in your skin, stop treatment and contact your doctor.
Side effects that require special attention: Hypersensitivity (rash, redness, exacerbation of the condition, swelling), rare: stop treatment and contact your doctor!
Development of infection, rare: stop treatment and contact your doctor!
The following effects are rare but more common in children and infants: Increased hair growth, increased blood pressure, weight gain, swelling of the face, rounded face, thinning of the skin, pigmentation of the skin: each one of these cases requires immediate referral to the doctor for discontinuation of treatment under medical supervision. In the event that you experience side effects not mentioned in this leaflet, or if there is a change in your general health, consult your doctor immediately.

Adverse reactions and drug interactions in children and infants: Parents must inform the attending doctor about any side effects, as well as any additional medicine being taken by the child! See above for details of special side effects.

Recommended dosage: Dosage is according to doctor's instructions only. Do not exceed the recommended frequency or duration of treatment.
Unless otherwise instructed by your doctor: Clean the area to be treated before use. With clean hands, gently apply a small amount of the cream/ointment on the affected area until it is completely absorbed, once or twice daily. Upon improvement the number of applications can be reduced to once daily or even less frequently. Do not use on facial skin for a period longer than 5 days, unless otherwise indicated by the doctor.
The ointment is recommended for use on dry skin where penetration is difficult.
The cream is recommended for use on wet weepy areas and on areas where convenient rinsing is desired.
Unless otherwise indicated by the doctor, avoid occlusive dressing of the affected area (disposable diapers for babies are considered as occlusive).
If there is no improvement in your condition within a week, refer to your doctor again.

Dosage for children: Unless otherwise indicated by the doctor, infants and children should not be treated with this medicine for more than 5 days, especially in areas covered by diapers.
This medicine is not intended for the use of infants under one year of age.

Attention: Do not swallow! This medicine is intended for external use only. Avoid contact with the eyes, mucosal tissues and mouth area. In case of contact, rinse thoroughly with water.

How can you contribute to the success of the treatment?

Complete the full course of treatment as instructed by the doctor. Even if there is an improvement in your health, do not discontinue use of this medicine without consulting your doctor.

Avoid poisoning! This medicine, and all other medicines, must be stored in a safe place out of the reach of children and/or infants, to avoid poisoning. If you have taken an overdose, or if a child has accidentally swallowed the medicine, proceed immediately to a hospital emergency room and bring the package of the medicine with you.
Do not induce vomiting unless explicitly instructed to do so by a doctor! This medicine has been prescribed for the treatment of your ailment; in another patient it may cause harm. **Do not give this medicine to your relatives, neighbors or acquaintances.**
Do not take medicines in the dark! Check the label and the dose each time you take your medicine. Wear glasses if you need them.

Storage: Store in a cool place, below 25ºC. Do not freeze.
Even if kept in their original container and stored as recommended, medicines may be kept for a limited period only. Please note the expiry date of the medicine! In case of doubt, consult the pharmacist who dispensed the medicine to you.
Do not store different medications in the same package.

License numbers: **BETACORTEN G Cream:** 050.42.23259.00
BETACORTEN G Ointment: 050.45.23262.00

The format of this leaflet was determined by the Ministry of Health and its content was checked and approved by it.

الأعراض الجانبية التي تقتضي إهتماماً خاصاً: حساسية زائدة (طفح، إحمرار، تفاقم الحالة، إنتفاخ)، نادراً: توقف/ي عن العلاج وراجع/ي الطبيب!
تطور تلوث، نادراً: توقف/ي عن العلاج وراجع/ي الطبيب!
الأعراض المذكورة أدناه نادرة لكنها شائعة أكثر لدى الأطفال والرضع:
نمو متزايد للشعر، إرتفاع ضغط الدم، زيادة في الوزن، إنتفاخ في الوجه، وجه مستدير، ترقق الجلد، تصبغ الجلد: كل حالة من تلك الحالات تلزم التوجه الفوري إلى الطبيب من أجل إيقاف العلاج تحت إشراف طبي.
أما إذا ظهرت لديك أعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، أو إذا طرأ أي تغيير على شعورك العام، عليك عندئذ مراجعة الطبيب حالاً.

الأعراض الجانبية والتفاعلات بين الأدوية عند الأطفال والرضع:
على الوالدين إبلاغ الطبيب المعالج عن كل تأثير جانبي يبدو لدى الطفل/ة وعن أي دواء آخر يتم تناوله!
راجع/ي الفقرات المتعلقة بالأعراض الجانبية الخاصة المذكورة أعلاه.

المقادير الدوائية الإعتيادية: يستعمل الدواء حسب تعليمات الطبيب فقط.
لا تتجاوز/ي وتيرة وفترة العلاج الموصى بها.
في حالة عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب:
يجب تنظيف المنطقة المعالجة قبل الإستعمال. بيدين نظيفتين يجب الدهن بلطف، مرة حتى مرتين في اليوم، كمية صغيرة من الكريم/المرهم على المكان المصاب حتى الإمتصاص الكامل. عند التحسن بالإمكان تقليل عدد الدهنات إلى مرة واحدة في اليوم أو لفترات اقل تكراراً.
لا يجوز العلاج بالمستحضر على جلد الوجه لفترة تزيد عن ٥ أيام، إلا إذا صدرت تعليمات أخرى من الطبيب.
من الموصى به **إستعمال المرهم** في حالات يكون الجلد فيها جافاً وصعب التغلغل.
من الموصى به **إستعمال الكريم** في مناطق رطبة نازة وفي مناطق يهمنا غسل الكريم عنها بسهولة.
يجب الإمتناع عن تضميد المكان المصاب بضماد مسدود إلا إذا صدرت تعليمات أخرى من الطبيب (تعتبر الحفاضات أحادية الإستعمال للرضع ضمادات مسدودة).
يجب مراجعة الطبيب ثانية إذا لم يطرأ تحسن على حالتك الصحية خلال ٧ أيام.
المقادير الدوائية للأطفال: لا يجوز العلاج بالمستحضر لدى الرضع والأطفال أكثر من ٥ أيام وخاصة في المناطق المغطاة بواسطة الحفاضات، إلا إذا صدرت تعليمات أخرى من الطبيب.
هذا الدواء غير مخصص للإستعمال لدى الرضع دون سنة من العمر.

إنتبه/ي: هذا الدواء ليس للبلع! هذا الدواء مخصص للإستعمال الخارجي فقط. يجب الإمتناع عن تماس الدواء بالعينين، الأنسجة المخاطية وفي منطقة الفم. في حالة التماس يجب شطفهما جيداً بالماء.

كيف تستطيع/ين أن تساهم/ي في نجاح العلاج؟

يجب اكمال العلاج الموصى به من قبل الطبيب. لا تتوقف/ي عن استعمال هذا الدواء بدون تعليمات من الطبيب حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

تجنب/ي التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم.
إذا أفرطت في إستعمال المقادير الدوائية أو إذا بلع الطفل/ة خطأ من هذا الدواء، عليك التوجه إلى المستشفى حالاً مصطحباً/ة عبوة الدواء.
لا تسبب/ي التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب!
هذا الدواء وصف لعلاج مرضك، وقد يسبب الضرر لمريض آخر.
لا تعط/ي من الدواء إلى أقاربك، جيرانك أو معارفك.
لا تتناول/ي الدواء في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقادير الدوائية في كل مرة تتناول/ين فيها دواء. ضع/ي النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

التخزين: في مكان بارد، دون ٢٥ درجة مئوية. لا يجوز التجميد.
تبقى الأدوية صالحة لفترات محدودة فقط، حتى ولو ظلت في علبتها الأصلية وتم حفظها بموجب تعليمات الخزن. الرجاء ملاحظة تاريخ إنتهاء صلاحية المستحضر المدونة على العبوة. في حالة الشك! عليك إستشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء. لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العبوة.

رقم سجل الدواء: **بيتاكورتين G كريم:** ٠٥٠ ٤٢ ٢٣٢٥٩ ٠٠
بيتاكورتين G مرهم: ٠٥٠ ٤٥ ٢٣٢٦٢ ٠٠

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها فُحص ورُخص من قبلها

Maabarot 40230
Israel Pharmaceutical Products
Maabarot Ltd.

TRIMA تـريما

معبروت ٤٠٢٣٠
الصناعات الإسرائيلية للأدوية
معبروت، م.ض.

0710C

106128110