



חברת פריגו מודיעה על השקת תכשיר (אביזר רפואי) חדש **episil®** המותווה להקלה בכאב הנובע מדלקת בריריות חלל הפה (Oral mucositis). מוקוזיטיס בפה (Oral mucositis) הוא הסיבוך המוכר ביותר בפה לאחר טיפול נגד סרטן. מוקוזיטיס מתאפיין בדלקת והתכייבות של רירית הפה ושל ריריות נוספות לאורך צינור מערכת העיכול, מלווה כאבים ובהפרעה בצריכת המזון, התייבשות ותת תזונה. מוקוזיטיס פוגע באיכות החיים של החולים וגורם לעלייה במדדים הרפואיים הבאים:

- צריכת נרקוטיקה
- מספר ומשך אירועי החום
- שכיחות זיהומים סיסטמיים
- משך האישפוז.

לעלייה במדדים אלו יש עלות כלכלית רחבה מעבר לעלות הטיפול במוקוזיטיס עצמו.

התוויה רשומה בארץ ל episil®:

Gives relief of pain via mechanical barrier action by protective film that Forms in situ and adheres to oromucosal surface.

Intended use of episil® includes oral mucositis that may be caused by chemotherapy or radiotherapy.

המרכיבים העיקרים הם:

- Soybean Phosphatidylcholine (PC)
- Glycerol dioleate (GDO)

מרכיבים אלו נמצאים בשימוש נרחב בתעשיית התרופות הקוסמטיקה והמזון.

מנגנון הפעולה של episil®:

ל-episil® מנגנון פעולה ייחודי, במגע עם כמות קטנה של רוק המצוי בחלל הפה תערובת הליפידים (Mixture lipid) הופכת לקרום ליפדי (lipid membrane) שמהווה שכבת הגנה מכאנית הנצמדת כדבק ביולוגי לרירית בחלל הפה.

במחקרים קליניים נמצא:

- הקלה משמעותית בכאב
- השפעה מהירה תוך כ-10 דקות
- השפעה ממושכת למשך 8 שעות

אופן השימוש ב-episil®

המינון המומלץ : יש להתיז 1-3 פעמים בחלל הפה. לפזר בעזרת הלשון את החומר על האזורים הפגועים בפה להמתין מספר דקות להפיכת הנוזל לג'ל ולהיווצרות שכבת המגן. Episil® מיועד לשימוש בחלל הפה בלבד.

תדירות המתן: לשימוש 2-3 פעמים ביום, על פי הצורך.

לפרטים נוספים www.episil.co.il