

מאי 2010

רופא/ה נכבד/ה רוקח/ת נכבד/ה,

הנדון: עדכון הכיתוב על גבי העלון לצרכן

VISINE ORIGINAL
VISINE A.C.

התוויות מאושרות :

VISINE ORIGINAL - Relief from soreness, burning, itching, irritation redness due to congestion of the eyes.

VISINE A.C. - For relief of minor eye irritation caused by the common cold or by allergens including smoke, pollen, dust, plants, etc.

הרכב:

VISINE ORIGINAL - Tetrahydrozoline HCl 0.05%

VISINE A.C. - Tetrahydrozoline HCl 0.05% , Zinc Sulphate 0.25%

הרינו להודיעכם כי חל עדכון בעלון לצרכן, כדלקמן:

- **קבוצה תרפויטית - מפחיתי גודש סימפטומימטים.**
- **מתי אין להשתמש בתכשיר -** אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול ביתר לחץ דם, סוכרת.
- **אזהרות -** שימוש רצוף ממושך יותר מ-4 ימים עלול להגביר את האדמומיות בעיניים.
- **תגובות בין תרופתיות -** אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיבוכים או אי יעילות הנובעים מתגובות בין תרופתיות, במיוחד לגבי תרופות נגד דיכאון מקבוצת מונואמינאוקסידאז (MAOI, כגון פנלזין) או תרופות אחרות נגד דיכאון.
- **תופעות לוואי -** בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי, כגון: בחילה, הרחבת אישונים.
- **תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת -** תופעות של רגישות יתר (נדיר) – יש להפסיק הטיפול ולפנות לרופא. במידה והאדמומיות או הגירוי בעיניים אינם חולפים או מחמירים יש להפסיק הטיפול ולפנות לרופא. במינונים מאוד גבוהים עלולים להתפתח לחץ דם גבוה, הפרעות בתפקוד הלב, יתר סוכר בדם (היפרגליקמיה)- יש להפסיק הטיפול ולפנות לרופא.
- **אחסנה -** אחסן/י בטמפ' בין 15-25°C.

בברכה,
יואל ששון
מנהל רישום