

עלון לצרכנית לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986

תרופה זו חיבת במרשם רופא

קראי/ בעיון את העלון עד סופו
בטרם תשתמשי/ בתרופה

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות

ותוכנו בדקד אאושר על-יידו בדצמבר 2009

סוויס רליף דואל רליס

כמוסות

הרכב:

כל כמוסה מכילה: Diclofenac sodium 75 mg

חומרים בלתי פעילים:

Talc, microcrystalline cellulose, povidone K25, colloidal anhydrous silica, propylene glycol, poly[ethylacrylate-co-methylmethacrylate-co-(2-trimethylammonioethyl)methacrylate chloride] (1:2:0.1), poly[ethylacrylate-co-methylmethacrylate-co-(2-trimethylammonioethyl)methacrylate chloride] (1:2:0.2), methacrylic acid-ethylacrylate-copolymer (1:1) (Ph. Eur.), dibutyl phthalate, gelatin, indigo carmine (E132), titanium dioxide (E171), sodium lauryl sulfate, printing ink.

קבוצה תרפויטית:

נוגדי דלקת לא סטרואידיים (NSAIDs).

פעילות רפואית:

סוויס רליף דואל רליס משמש לטיפול בכאב ובדלקת בשל: התקפת שיגרון (גאوت) חריפה, הפרעות חריפות של מערכת השרירים והשלד, ניתוח דנטלי או ניתוח אחר בהיקף קטן, הפרעות בתפקוד המפרקים, כאבי גב תחתון, מצבי טראומה (מקעים, מתיחות, שברים).

מתי אין להשתמש בתכשיר?

אל תשתמשי בתרופה כאשר הינך בהריון בשלש אחרון או מיניקה.

אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה או לתכשירים אחרים ממשפחת נוגדי הדלקת שאינם סטרואידיים (NSAIDs).

אין להשתמש אם הינך סובל/ת מכיב בקיבה או במעי, דם בצואה או צואה שחורה, או אם סבלת בעבר משני מקרים או יותר של כיבם, דימום מהקיבה או ניקובה.

אין להשתמש אם סבלת מדימום מוחי (cerebrovascular bleeding) או אם הינך סובל/ת מכל דימום פעיל אחר.

אם הינך סובל/ת מליקוי חמור בתפקוד הכבד, הכליות או הלב.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:

אם הינך בהריון.

אם הינך סובל/ת מהפרעות מולדות במערכת הדם (inducible porphyrias).

אם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד: מערכת הנשימה (אסתמה, מחלה נשימתית חסימתית וקודחת השחח), הלב ו/או כלי הדם, הכבד (כגון: Hepatic porphyria), הכליה/מערכת השתן, מערכת העיכול (כגון: קולטיס כיבית ומחלת Crohn’s), מערכת הדם (הפרעות קרישה), מפולפים באף, יתר לחץ דם, מחלות אוטואימוניות (כגון: זאבת אדמנתית (Lupus Erythematosus) ומחלות רקמות חיבור מעורבות (mixed connective tissue diseases), איזרום מוחי, סוכרת, רמה גבוהה של כולסטרול בדם, אם הינך מעשן/ת. ראה/י גם בסעיף "אזהרות".

איך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך?

השימוש בתרופה במינון גבוה עלול לפגום בעירנות ועל כן מחייב זהירות בנהיגה ברכב, בהפעלת מכונות מסוכנות ובכל פעילות המחייבת עירנות.

אין לשתות משקאות אלכוהולים בתקופת הטיפול בתרופה.

סוויס רליף דואל רליס עלול לגרום לרגישות יתר עם חשיפה לשמש; על כן יש להימנע מחשיפה לשמש ולדאוג להגנה מתאימה (בגדים ארוכים, כובע, משחות הגנה וכו').

אזהרות:

אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא.

תרופות כדוגמת **סוויס רליף דואל רליס** קשורות בעלייה קטנה בסיכון להתקפי לב ואירוע מוחי.

הסיכון קשור למונחים גבוהים של התרופה ולמשך טיפול ממושך. אם הינך סובל/ת מבעיות בתפקוד הלב, או סבלת בעבר מאירוע מוחי, או אם הינך סבור/ה שאת/ה בסיכון למצבים אלו (למשל אם יש לך לחץ דם גבוה, סוכרת או רמה גבוהה של כולסטרול בדם או הינך מעשן/ת) - יש להיוועץ ברופא.

בתקופת טיפול ממושך בתרופה, או בטיפול המצריך מינונים גבוהים יש לבצע בדיקות דם, שתן ותפקודי הכבד והכליות.

יתכן עלייה באנזימי הכבד המחייבת הפסקת הטיפול לאחר התייעצות עם הרופא.

אם הינך רגיש/ה למוזן כלשהו או לתרופה כלשהי, עלך לדווח על כך לרופא לפני נטילת התרופה.

אם לא חל שיפור במצבך תוך חודש יש להיוועץ ברופא.

אם הינך עומד/ת לעבור פרוצדורה ניתוחית (כולל ניתוח דנטלי) יש לדווח לרופא על נטילת תרופה זו.

עלך לדווח לרופא אם הינך עומד/ת לעבור בדיקות מעבדתיות מאחר והטיפול בתרופה עלול להפריע לתוצאות.

בחזמה לתרופות אחרות מקבוצתו, **סוויס רליף דואל רליס** עלול להקשות על האפשרות להרות. יש להיוועץ בחפא אם הינך מתכננת להרות או אם הינך נתקלת בקושי להרות.

תגובות בין-תרופתיות:

אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת או אם גמרת זה עתה טיפול בתרופה אחרת, עלך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות, במיוחד לגבי תרופות מהקבוצות הבאות: אספירין וסליצילאטים או תרופות אחרות מקבוצת NSAID לטיפול בכאב ובדלקת, תרופות למניעת קרישת דם (כגון וורפארין), משתנים, ליתיום, תרופות לטיפול בירת לחץ דם ובמחלות לב, פניטואין וחומצה וולפרואית (תרופות אנטי אפילפסיות), פורבנדיז ותרופות לטיפול בשיגרון מקבוצת ה- sulfonpyrazone, מתוטרקסאט, ציקלוספורין או טקורולימוס, תרופות לטיפול בסוכרת ודיגוקסין, אנטיביוטיקות מסיסומות (כגון ציפחפולוקסצין), סטרואידים, מופפריסטון (לסיים מוקדם של היריון), תרופות ממשפחת ה-SSRI (לטיפול בדיכאון), זידודין (לטיפול באיידס).

תופעות לוואי:

בנוסף לפעולות הרצויה של התרופה בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות לוואי, כגון:

עצירות, אובדן התיאבון, כאב ראש, סחרחורת, צרבת, כאב בטן קל, גזים, רגישות לאור השמש (יש לדאוג להגנת העור).

תופעות לוואי המחייבות התייחסות מיוחדת:

חום, החמרת הכאב, נפיחות בפנים, נפיחות הלשון והלוע, קוצר או קשיי נשימה, עלייה בקצב לב, עלייה בלחץ דם או כאב בחזה, נפיחות בגפיים, בפינים או בשרתים, כאבי בטן עזים, צואה דמית או שחורה, שתן דמי, הקאת דם, דימום מהאף, פריחה או גירוי עורי, שינויים או הפרעות בראייה, ירידה במתן שתן, טנטון או הפרעות בשמיעה, סימפטומים הדומים לדלקת קרום המוח: קשייון עורף, כאבי ראש עזים, קשייון שרירים, בחילות והקאות חריפות, כאבים בעמוד השרדר, ערפול ואובדן כושר התמצאות: יש להפסיק מיד את הטיפול ולפנות לרופא מיד!

סימנים לפגיעה אפשרית בכבד: בחילות, עייפות, חולשה, גרד, צהבת, רגישות באזור הבטן, סימנים דמויי שפעת ושלשול; יש להפסיק את הטיפול ולפנות לרופא.

בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, עלך להתייעץ עם הרופא מיד.

מינון מקובל בהיעדר הוראה אחרת מרופא:

מינון לפי הוראות הרפא בלבד.

אין לעבור על המנה המומלצת.

תרופה זו אינה מיועדת לילדים.

אם שכחת ליטול את התרופה בזמן הקצוב, יש ליטול מנה מיד כשזכרכת, אין ליטול שתי מנות ביחד!

אופן השימוש:

יש ליטול את התרופה עם כוס מים. אין ללעוס!

אין לשבור את הכמוסה.

יש ליטול את התרופה בזמן הארוחה או מיד לאחר מכן.

שימי לב, מנע/י הרעלה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע/י הרעלה. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה/י מיד לחדר מיון של בית-חולים, והבא/י אריזת התרופה איתך.

אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך; בחולה אחר/ת היא עלולה להזיק.

אל יתנו/י תרופה זו לקרוביך, שכניך או מכריך.

אין ליטול תרופות בחושך יש לבדוק התוויות והמנה **בכל פעם** שהינך נוטל/ת תרופה. יש להרכיב משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

אחסנה:

במקום קריר ויבש, מתחת ל- 25°C.

גם לפי תנאי האריזו/האחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עלך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.

אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס' רישום התרופה: 142 10 31815 00

נشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) ١٩٨٦

هذا الدواء ملزم بوصفة طبيب

إقرأ/ي النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها
فحص ورخص من قبلها في كانون الأول ٢٠٠٩

سوئس ریلیف دووال ریلیس كبسولات

التركيب:

كل كبسولة تحتوي على: Diclofenac sodium 75 mg

المواد غير الفعالة:

Talc, microcrystalline cellulose, povidone K25, colloidal anhydrous silica, propylene glycol, poly[ethylacrylate-co-methylmethacrylate-co-(2-trimethylammonioethyl)methacrylate chloride] (1:2:0.1), poly[ethylacrylate-co-methylmethacrylate-co-(2-trimethylammonioethyl)methacrylate chloride] (1:2:0.2), methacrylic acid-ethylacrylate-copolymer (1:1) (Ph. Eur.), dibutyl phthalate, gelatin, indigo carmine (E132), titanium dioxide (E171), sodium lauryl sulfate, printing ink.

الفصيلة العلاجية: من مضادات الالتهاب اللاستيروئيدية.

تأثيرات الدواء الطبية:

يستعمل الدواء لعلاج الألم والالتهاب الناتج عن: نوبة حادة للقرص، إضطرابات حادة في جهاز العضلات والهيكل العظمي، جراحة سنّية أو جراحة أخرى خفيفة، إضطرابات في وظيفة المفاصل، آلام أسفل الظهر، حالات الرضوض (التواء، شد، كسور).

منى لا يجوز لك إستعمال المستحضر؟

لا تستعملی هذا الدواء عندما تكونين في الثلث الأخير من الحمل أو في فترة الرضاعة.

لا يجوز إستعمال هذا الدواء إذا وجدت لديك حساسية لأحد مركباته أو لمستحضرات أخرى من فصيلة مضادات الالتهاب اللاستيروئيدية.

لا يجوز إستعماله إذا كنت تعاني/ن من قرحة في المعدة أو الأمعاء، دم في البراز أو براز أسود، أو إذا عانيت في الماضي من حالتين أو أكثر من القرحة، نزف في المعدة أو ثقب فيها.

لا يجوز إستعمال الدواء إذا عانيت من نزف دماغي أو إذا كنت تعاني/ن من أي نزف نشط آخر.

إذا كنت تعاني/ن من خلل خطير في وظيفة الكبد، الكلى أو القلب.

لا يجوز لك إستعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب مقدّما:

عندما تكونين في فترة الحمل.


PharmaSwiss
Choose More Life

SD01B001L01

PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH THE PHARMACISTS' REGULATIONS (PREPARATIONS) - 1986

This medicine requires a doctor's prescription
Read this package insert carefully in its entirety before using this medicine
The format of this leaflet was determined by the Ministry of Health and its content was checked and approved in December 2009

SWISS RELIEF DUAL RELEASE Capsules

Composition:

Each capsule contains: Diclofenac sodium 75 mg

Inactive ingredients: Talc, microcrystalline cellulose, povidone K25, colloidal anhydrous silica, propylene glycol, poly[ethylacrylate-co-methylmethacrylate-co-(2-trimethylammonioethyl)methacrylate chloride] (1:2:0.1), poly[ethylacrylate-co-methylmethacrylate-co-(2-trimethylammonioethyl)methacrylate chloride] (1:2:0.2), methacrylic acid-ethylacrylate-copolymer (1:1) (Ph. Eur.), dibutyl phthalate, gelatin, indigo carmine (E132), titanium dioxide (E171), sodium lauryl sulfate, printing ink.

Therapeutic group:

Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs).

Therapeutic activity:

Swiss Relief Dual Release is for the treatment of pain and inflammation due to: acute attack of gout, severe disorders of the musculoskeletal system, dental surgery or other minor surgery, joint function disturbances, lower back pain and cases of trauma (sprains, strains, fractures).

When should the preparation not be used?

Do not use this medicine if you are pregnant in the last trimester or breastfeeding.

Do not use this medicine if you are sensitive to any of its ingredients or to any other NSAIDs.

Do not use if you have a gastric or intestinal ulcer, blood in your stools or black stools, or if you have suffered from two or more episodes of ulcers, gastric bleeding or perforation in the past.

Do not use if you have suffered from cerebrovascular bleeding or if you suffer from any other active bleeding.

If you suffer from severe impairment of the liver, the kidney or the heart function.

Do not take this medicine without consulting a doctor before starting treatment:

If you are pregnant.

If you suffer from congenital blood system disorders (inducible porphyrias).

If you are suffering, or have suffered in the past, from impaired function of: the respiratory system (asthma, obstructive respiratory disease and hay fever), the heart and/or vascular system, the liver (e.g.: hepatic porphyria), the kidney/urinary tract, the digestive system (e.g.: ulcer, ulcerative colitis and Crohn's disease), the blood system (coagulation disorders), from nasal polyps, hypertension, autoimmune diseases (e.g.: lupus erythematosus and mixed connective tissue diseases), stroke, diabetes, high blood cholesterol level, if you smoke. See also "Warnings".

How will this medicine affect your daily life?

Use of this medicine at a high dosage may impair alertness. Therefore, caution should be exercised when driving a car, operating dangerous machinery and when engaging in any activity requiring alertness.

Do not drink alcoholic beverages during treatment with this medicine.

Swiss Relief Dual Release may cause hypersensitivity if the patient is exposed to the sun; therefore avoid exposure to the sun and take appropriate precautions (long clothes, a hat, protective creams, etc.).

Warnings:

Do not use this medicine frequently, or for a prolonged period, without consulting the doctor.

Medicines such as **Swiss Relief Dual Release** are associated with a slightly increased risk of heart attack and stroke.

The risk is associated with high dosages of the medicine and a prolonged period of treatment. If you suffer from heart function problems, or if you have suffered from a stroke in the past, or if you think you may be at risk for these conditions (for instance, if you have high blood pressure, diabetes or a high blood cholesterol level, or if you smoke) - consult the doctor.

During prolonged treatment with the medicine or when treatment involves high dosages the following tests should be carried out: blood, urine, liver and kidney function.

There may be an elevation in liver enzymes that requires discontinuation of treatment after consulting your doctor.

If you are sensitive to any type of food or medicine, inform your doctor before commencing treatment with this medicine.

If there is no improvement in your condition within one month consult the doctor.

If you are about to undergo a surgical procedure (including dental surgery) inform the doctor that you are taking this medicine.

Tell your doctor if you are about to undergo laboratory tests, since treatment with this medicine may interfere with the results.

As with other medicines of the same group, **Swiss Relief Dual Release** may impair the ability to conceive. Consult with your doctor if you are planning to conceive or if you have had difficulties conceiving.

Drug interactions:

If you are taking another drug concomitantly or if you have just finished treatment with another medicine, inform the attending doctor, in order to prevent hazards or lack of efficacy arising from drug interactions. This is especially important for medicines belonging to the following groups: aspirin and salicylates or other NSAIDs for the treatment of pain and inflammation, anticoagulants (e.g. warfarin), diuretics, lithium, medicines for the treatment of hypertension and heart diseases, phenytoin and valproic acid (antiepileptics), probenecid and medicines for the treatment of gout from the sulfapyrazone group, methotrexate, cyclosporine or tacrolimus, medicines for the treatment of diabetes and digoxin, certain antibiotics (e.g. ciprofloxacin), steroids, mifepristone (for early termination of pregnancy), SSRIs (for the treatment of depression), zidovudine (for the treatment of AIDS).

Side effects:

In addition to the desired effect of the medicine, adverse reactions may occur during the course of taking this medicine, for example:

constipation, loss of appetite, headache, dizziness, heartburn, mild abdominal pain, flatulence, sensitivity to sunlight (be sure to protect your skin).

Side effects that require special attention:

Fever, worsening of pain, swelling of the face, swelling of the tongue and inner larynx, shortness of breath or difficulty breathing, increased heart rate, elevated blood pressure or chest pain, swelling of the extremities, the face or the lips, severe abdominal pains, bloody or black stool, blood in the urine, vomiting blood, nosebleed, skin irritation or rash, vision changes or disturbances, decreased passing of urine, tinnitus or hearing disturbances, meningitis like symptoms: stiff neck, severe headaches, muscle stiffness, acute nausea and vomiting, spinal pain, foggy and disorientation: stop treatment immediately and contact your doctor right away!

Signs of possible liver damage: nausea, fatigue, weakness, itching, jaundice, abdominal tenderness, flu-like symptoms and diarrhea: stop treatment and contact the doctor.

In the event that you experience side effects not mentioned in this leaflet, or if there is a change in your general health, consult your doctor immediately.

Recommended dosage unless otherwise instructed by your doctor:

Dosage is according to the doctor's instructions only.

Do not exceed the recommended dose.

This medicine is not intended for children.

If you forget to take this medicine at the scheduled time take a dose as soon as you remember, but never take two doses together!

Directions for use:

Take the medicine with a glass of water. Do not chew!

Do not break the capsule.

Take the medicine with or immediately after a meal.

Be careful, avoid poisoning!

This medicine, and all other medicines, must be stored in a safe place out of the reach of children and/or infants, to avoid poisoning.

If you have taken an overdose or if a child has accidentally swallowed the medicine, proceed immediately to a hospital emergency room and bring the package of the medicine with you.

Do not induce vomiting unless explicitly instructed to do so by a doctor!

This medicine has been prescribed for the treatment of your ailment; in another patient it may cause harm.

Do not give this medicine to your relatives, neighbors or friends.

Do not take medicines in the dark! Check the label and the dose each time you take your medicine. Wear glasses if you need them.

Storage:

Store in a cool and dry place, below 25°C.

Even if kept in their original container and stored as recommended, medicines may be kept for a limited period only. Please note the expiry date of the medicine! In case of doubt, consult the pharmacist who dispensed the medicine to you.

Do not store different medications in the same package.

Registration Number: 142 10 31815 00

Manufacturer:

Temmler Werke GmbH,
Weihenstephaner Str. 28, 81673 Munich, Germany

Importer:

PharmaSwiss Israel Ltd.,
Bet Hapaamon, 20 Ha'Taas St.,
P.O.B. 97, Kefar-Saba 44425

أما إذا ظهرت لديك أعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، أو إذا طرأ أي تغيير على شعورك العام، عليك عندئذ مراجعة الطبيب حالاً.

الجرعة الدوائية الاعتيادية في حالة عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب:

يستعمل الدواء حسب تعليمات الطبيب فقط. لا تتجاوز/ي الجرعة الموصى بها.

هذا الدواء غير مخصص للاستعمال لدى الأطفال.

إذا حدث ونيسبت تناول الجرعة في الوقت المعين ثم تذكرت بذلك، فيجب تناولها حالاً! لا يجوز تناول جرعتين معاً.

إرشادات الاستعمال:

يجب تناول هذا الدواء مع كأس من الماء.

لا يجوز مضغ أو كسر الكبسولة.

يجب تناول هذا الدواء أثناء الطعام أو حالاً بعد إنتهاء الطعام.

إنته/ي، تجنب/ي التسمم!

يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم.

إذا أفرطت في تناول الجرعة الدوائية أو إذا بلغ الطفل/ة خطأ من هذا الدواء، عليك التوجه إلى المستشفى حالاً مصطحباً/ة عبوة الدواء.

لا تسبب/ي التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب!

هذا الدواء وصف لعلاج مرضك، وقد يسبب الضرر لمرضى آخر.

لا تعط/ي من الدواء إلى أقرابك، جيرانك أو معارفك.

لا تتناول/ي الدواء في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول/ين فيها دواء.

ضع/ي النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

التخزين: في مكان بارد وجاف، دون ٢٥ درجة مئوية.

تبقى الأدوية صالحة لفترات محدودة فقط، حتى ولو ظلت في علبتها الأصلية وتم حفظها بموجب تعليمات التخزين. الرجاء ملاحظة تاريخ إنتهاء صلاحية المستحضر المدونة على العبوة. في حالة الشك! عليك إستشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء.

لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العبوة.

رقم سجل الدواء: ١٤٢١٠ ٢١٨١٥ ٠٠

المنتج:

Temmler Werke GmbH,
Weihenstephaner Str. 28, 81673 Munich, Germany

المستورد:

فارماسويس إسرائيل م.ض.،
بيت هياعامون، شارع هتااس ٢٠،
ص.ب. ٩٧، كفار سابا ٤٤٤٢٥

العلاج بهذا الدواء قد يتدخل في نتائج هذه الفحوص. كما هو عليه في أدوية أخرى تنتمي لفصيلة هذا الدواء، فإن سويس ريليف دوال ريليس يمكن أن يسبب صعوبة في إمكانية الحمل. يجب إستشارة الطبيب إذا كنت تخططين للحمل أو إذا كنت تواجهين صعوبة في حصول الحمل.

التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تتعاطي/ين دواءً إضافياً أو إذا أنهيت العلاج الآن بدواء آخر، فيجب إعلام الطبيب المعالج، وذلك لتفادي الأخطار أو عدم النجاعة الناتجة عن التفاعلات بين العقاقير، خاصة الأدوية التي تنتمي إلى المجموعات التالية: أسبيرين والساليسيلات أو أدوية أخرى من فصيلة مضادات الإلتهاب الاستيروئيدية لعلاج الألم والإلتهاب، مضادات تخثر الدم (كالورفارين)، المدرات البولية، ليتيوم، أدوية علاج إرتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، فينيتوثين وحضم فالبروثيك (أدوية مضادة للصرع)، بروبينسيد وأدوية علاج النقرس من فصيلة سولفيبيرازون، ميتوتريكسات، سيكلوسبورين أو تاكروليموس، أدوية علاج السكري وديجوكسين، مضادات حيوية معينة (كالسيروفلوكساسين)، ستيروئيدات، ميغيفريستون (للإنتهاء المبكر من الحمل)، أدوية من فصيلة المثبطات الإنقائنية لإعادة إمتصاص السيروتونين (SSRIs) (لعلاج الإكتئاب النفسي)، زيدوفودين (لعلاج الأيدز).

الأعراض الجانبية:

إضافة إلى التأثيرات الطبية المرغوبة للدواء، فقد تظهر أثناء فترة إستعماله بعض الأعراض الجانبية، مثل:

إمساك، فقدان الشهية للطعام، صداع، دوار، حرقان، ألم خفيف في البطن، غازات، حساسية لضوء الشمس (يجب الحرص على حماية الجلد).

الأعراض الجانبية التي تقتضي اهتماماً خاصاً:

سخونة، تفاقم الألم، إنتفاخ في الوجه، إنتفاخ اللسان والبلعوم، ضيق أو صعوبة في التنفس، زيادة نظم القلب، إرتفاع ضغط الدم أو ألم في الصدر، إنتفاخ في الأطراف، في الوجه أو الشفتين، آلام شديدة في البطن، براز دموي أو أسود، بول دموي، تقيؤ دموي، رعاف، طغى أو تهيج في الجلد، تغيرات أو إضطرابات في الرؤية، نقص التبول، طنين أو إضطرابات في السمع، أعراض تشبه إلتهاب السحايا الدماغية، تصلب مؤخر الرقبة، صداع شديد، تصلب العضلات، غثيان وتقيؤات شديدة، آلام في العمود الفقري، ضبابية وتوهان: يجب التوقف عن العلاج حالاً ومراجعة الطبيب حالاً!

علامات لإصابة ممكنة في الكبد: غثيان، إرهاق، ضعف عام، حكة، يرقان، حساسية في منطقة البطن، علامات تشبه الإنفلونزا وإسهال: يجب التوقف عن العلاج ومراجعة الطبيب.

 **PharmaSwiss**
Choose More Life
SD01B001L01