

פורטט עלון זה נקבע על-ידי משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר בפברואר 2017 **עלון לצרכן לִי תַּקְנוּת הַרוּקְחִים (תַּכְשִׁימִים) הַתַּשְׁמִי" – 1986** להורפה שמוקדת על-ידי מרשם רופא בלבד

יומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל תמיסה להזרקה במזרק מוכן להזרקה

חומר פעיל:

כל מזרק מוכן להזרקה מכיל:

אדאלימומאב 40 מ"ג ב- 0.4 מ"ל

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים - ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

בנוסף לעלון, לתכשיר יומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל קיים כרטיס מידע בטיחותי למטופל. כרטיס זה מכיל מידע בטיחותי חשוב, שעליו לדעת, לפני התחלת הטיפול ובמהלך הטיפול ב- יומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל ולפעול על פיו. יש לעיין בכרטיס מידע בטיחותי למטופל ובעלון לצרכן בטרם תחילת השימוש בתכשיר. יש לשמור את הכרטיס לעיון נוסף במידת הצורך.

תרופה זו נרשמה עבורך, אל תעביר אותה לאחרים, היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

התרופה בצורת אריזה זו מיועדת אך ורק למבוגרים וילדים הזקוקים למנה של 40 מ"ג ומעלה. למידע נוסף ראה סעיף 11 בילדים ומתבגרים."

1) למה מיועדת התרופה?

יומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל מפחיתה דלקתי (הדלקתי מחלות שלהן מיועדת התרופה, המכריז הפעיל, אדאלימומאב (adalimumab), הוא נוגדן חד-שבטי ממקור אנושי שימופק מתאים בתרביית.

נוגודים חד-שבטיים הם חלבונים שמזהים ונקשרים לחלבונים ייחודיים אחרים. אדאלימומאב (adalimumab) נקשר לחלבון מסוים (טמור) נקרוזיס פקטור - (TNF), שנמצא ברמות גבוהות במחלות דלקתיות ועל-ידי כך חוסם את פעילותו ומפחית את התהליך הדלקתי.

יומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל מיועדת לטיפול ב:

- דלקת מפרקים שגרנית (rheumatoid arthritis) פעילה, בינונית עד חמורה, במבוגרים, כאשר טיפול מקובל אחר לא הצליח.
- דלקת מפרקים שגרנית (rheumatoid arthritis) חמורה, פעילה ומתקדמת במבוגרים אשר לא טופלו בעבר עם methotrexate.
- דלקת מפרקים שגרנית בילדים ובמתבגרים (polyarticular juvenile idiopathic arthritis) פעילה, מגיל שנתיים עד 17, כאשר טיפול מקובל אחר לא הצליח.
- דלקת חוליות מקשחת (ankylosing spondylitis) פעילה וחמורה, במבוגרים, כאשר טיפול מקובל אחר לא הצליח.
- אקטיאל ספונדילוארטריטיס ללא עדויות רדיוגרפיות לדלקת חוליות מקשחת (axial spondyloarthritis without radiographic evidence of ankylosing spondylitis) (Axial spondyloarthritis) חמורה במבוגרים, כאשר הייתה תגובה לא מספקת או אי סבילות לתרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידיות (NSAIDs).
- דלקת מפרקים ספחתית (psoriatic arthritis) פעילה ומתקדמת, במבוגרים, כאשר טיפול מקובל אחר לא הצליח.
- ספחת רובדית (plaque psoriasis) בינונית עד חמורה במבוגרים, כאשר טיפול מקובל אחר לא הצליח או שאינו מתאים.
- טיפול מקומי מקובל או טיפול באור (פוטותרפיה) אינו מתאים או לא הצליח.
- מחלת קרוהן (Crohn's disease) פעילה וחמורה, בילדים מגיל 6 עד 17 שנים כאשר טיפול מקובל אחר לא הצליח, או שאינו מתאים.
- מחלת קרוהן (Crohn's disease) פעילה, בינונית עד חמורה, במבוגרים כאשר טיפול מקובל אחר לא הצליח, או שאינו מתאים.
- דלקת כיבית בינונית עד חמורה של המעי הגס (ulcerative colitis) במבוגרים, כאשר טיפול מקובל אחר לא הצליח, או במטופלים שלא יכולים לקבל טיפולים מקובלים אחרים.
- הידראדיטיס סופורטיבה (hidradenitis suppurativa) פעילה בדרגה בינונית עד חמורה במבוגרים כאשר טיפול מקובל אחר לא הצליח.
- דלקת מפרקים הקשורה לפוליטיס (דלקת אזויר החיבור של הגיד לעצם - enthesitis-related arthritis) פעילה במטופלים מגיל 6 ומעלה, כאשר טיפול מקובל - אחר לא הצליח או שאינו מתאים.
- מחלות בכבץ המתבטאות במעי (Intestinal Behcet's disease) כאשר טיפול מקובל אחר לא הצליח.
- אובאטיס (Uveitis) - דלקת של העיבה (כוללת, אחרות או אמצעות), ממקור לא זיהומי, במבוגרים, כאשר טיפול בסטרואידים אינו מתאים או אינו מספק.

אין מידע לגבי שימוש ביומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל בילדים מתחת לגיל שנתיים.

קבוצה תרפויטית: חסם TNF.

2) לפני השימוש בתרופה

⚠ אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (לרשימת המרכיבים הלא פעילים ראה סעיף 6 "מידע נוסף").
- אתה סובל מיהומ חמור, כולל שחפת פעילה (ראה פירוט נוסף בסעיף "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה"). חשוב שתיעד את הרופא אם יש לך תסמינים של זיהום, כגון: חום, פצעים, תחושת עייפות ובעיות נשיניים.
- אתה סובל מאי ספיקת לב בדרגה בינונית או חמורה. חשוב שתיעד את הרופא אם אתה סובל או סבלת בעבר ממצב לבבי חמור (ראה פירוט נוסף בסעיף "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה").

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

תגובות אלרגיות

אם אתה סובל מתגובות אלרגיות עם תסמינים כגון לחץ בחזה, צפצופים בנשימה, סחרחורת, נפיחות או פריחה, הפסק את הטיפול בתרופה ופנה מיד לרופא.

זיהומים

- אם אתה סובל מזיהום, כולל זיהום ממושך או זיהום מקומי (למשל כיב ברגל) היוועץ ברופא לפני השימוש ביומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל. אם אינך בטוח בעניין זה, צור קשר עם הרופא.

- במהלך הטיפול ביומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל אתה עלול ללקות בזיהומים בקלות רבה יותר. סיכון זה עלול להתמיר אם תפוקת הריאות שלך לקוי. זיהומים אלו עלולים להיות צריניים וכוללים:
 - שחפת
 - זיהומים שנגרמים על-ידי נגיפים, פטריות, טפילים או חיידקים

זיהומים מדמנים אחרים

אלח דם (sepsis)

במקרים נדירים, זיהומים אלו עלולים להיות מסכני חיים. חשוב לספר לרופא אם מופיעים אצלך תסמינים, כגון: חום, פצעים, תחושת עייפות או בעיות נשיניים. ייתכן שהרופא ימליץ להפסיק את הטיפול ביומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל באופן זמני.

היוועץ ברופא אם אתה גר או אם אתה נטל לאזורים שיש בהם זיהומים פטרייתיים מקומיים, כגון: היסטופלסמוזיס (histoplasmosis), קוקסידיומיקוזיס (coccidioidomycosis) או בלסטומיקוזיס (blastomycosis).

היוועץ ברופא אם סבלת בעבר מזיהומים חוזרים ונשנים או ממצבים אחרים המעלים את הסיכון לזיהומים.

אם הנך מעל גיל 65, אתה עלול להיות רגיש יותר לזיהומים בזמן הטיפול ביומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל. יש לשים לב לזכנות את הרופא אם מופיעים תסמינים של זיהום, כגון: חום, פצעים, תחושת עייפות ובעיות נשיניים.

שחפת

חשוב מאוד שתספר לרופא אם סבלת בעבר משחפת או היית במגע קרוב עם אדם שסבל בעבר משחפת. אם אתה סובל משחפת פעילה אל תשתמש ביומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל.

ממחר שדווח על מקרים של שחפת בקרב חולים שטופלו ביומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל, הרופא יבדוק אם יש לך סימנים או תסמינים של שחפת לפני שתתחיל את הטיפול ביומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל. זה יכול הערכה רופאות מקיפה, כולל היסטוריה הרפואית שלך ובדיקות אבחון מתאימות (למשל, צילום חזה ובדיקה לגילוי שחפת). תוצאות הבדיקות צריכות להיות מתועדות ב- "כרטיס מידע בטיחותי למטופל" שלך.

השפעת עלולה להתפתח במהלך הטיפול עם יומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל גם אם קיבלת טיפול מונע נגד שחפת.

אם מופיעים תסמינים של שחפת (למשל שיעול מתמשך, ירידה במשקל, חוסר אנרגיה, חום נמוך), או של זיהום כלשהו אחר במהלך הטיפול עם יומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל או אחריו, פנה מיד לרופא.

דלקת כבד נגיפית מסוג B

ספר לרופא אם אתה נשא של נגיף דלקת הכבד מסוג B (HBV, Hepatitis B), אם אתה סובל מדלקת כבד מסוג B פעילה או אם אתה חושב שאתה נמצא בסיכון להידבק בנגיף דלקת הכבד מסוג B.

על הרופא לבצע בדיקות על מנת לבדוק אם אתה נשא של נגיף דלקת הכבד מסוג B. באנשים שנשאים לנגיף, יומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל עלולה לגרום לפעילות מחודשת שלו.

במקרים נדירים, בעיקר אם אתה נטל תרופות אחרות שמדאוות את המערכת החיסונית, פעולת מחודשת של הנגיף יכולה להיות מסכנת חיים.

ניתוחים

- אם אתה עומד לעבור ניתוח או הליך דנטלי, עליך לידע את הרופא שאתה נוטל יומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל. ייתכן והרופא ימליץ להפסיק את הטיפול ביומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל באופן זמני.

מחלות המערכת תהליכי דמיאליניזציה

אם אתה סובל או מפתח מחלות המערכת תהליכי דמיאליניזציה כדוגמת טרשת נפוצה, הרופא חליט אם עליך לקבל או להמשיך לקבל יומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל. ספר מיד לרופא אם אתה מרגיש מסיפטומים כגון שינוי בראייה, חולשה בידים או ברגליים או חוסר תחושה או עקצוץ בכל חלק בגוף.

חיסונים

- חיסונים מסוימים עלולים לגרום לזיהומים ואין לקבל אותם בעת הטיפול ביומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל.

היוועץ ברופא לפני שאתה מקבל חיסון כלשהו.

במידת האפשר, מומלץ שילדים יטלימו את כל החיסונים הנדרשים על-פי הנחיות החיסון הנוכחיות לפני תחילת הטיפול ביומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל.

אם סוללת ביומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל במהלך הוויזון, התינוק שלך עלול להיות בסיכון גדול יותר ללקות בזיהום במהלך בחמישה חודשים לאחר התפוגה האחרונה שקיבלת בזמן ההריון. חשוב לדווח לרופאים ולצוות המטפל בתינוקך שטופלת ביומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל בזמן ההריון, כדי שהם יוכלו להחליט מתי התינוק שלך יוכל לקבל חיסונים.

בעיות לבביות

חשוב שתספר לרופא אם אתה סובל או סבלת מבעיות לבביות חמורות.

- אם אתה סובל מאי ספיקת לב קלה ואתה מטפל ביומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל, המצב של אי ספיקת הלב שלך צריך להיות מונטר בקפדנות על-ידי הרופא.

אם מתפתחים תסמינים חדשים של אי ספיקת לב או שחתסמינים הקיימים מחמירים (למשל: קוצר נשימה או התנפחות של כפות הרגליים), פנה מיד לרופא. הרופא יחליט אם עליך לקבל יומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל.

אם מתפתח אצלך חום שאינו חולי, חבורות, אם אתה מדמם בקלות רבה, או אם אתה נראה חיוור מאוד, פנה מיד לרופא. בחולים מסוימים הגוף לא מצליח לייצר כמות מספקת של תאי דם שמטייעים להחלים בזיהומים או בהפסקת דימומים. ייתכן והרופא יחליט להפסיק את הטיפול.

סרטן

הוארו מקרים נדירים מאד של גוגים מסוימים של סרטן אצל מבוגרים וילדים שטופלו באדאלימומאב או מחסמי TNF אחרים.

חולים בדלקת מפרקים שגרנית קשה יותר, שסובלים מן המחלה לאורך זמן, עלולים להיות בעלי סיכון גבוה מהמומצע לחלות בלימפומה (סוג של סרטן הפוגע במערכת הלימפטית) ולוקמיה (סוג של סרטן הפוגע במח העצם ובדם).

אם אתה מטופל ביומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל, הסיכון שתלקיח בלימפומה, בלוקמיה בסרטן מסוג אחר עלול לעלות. במקרים נדירים נצפה סוג יחידיו וקשה של לימפומה במטופלים לוקמיה אדאלימומאב. אם מטופלים אלו טופלו גם ב- azathioprine או 6-mercaptopurine. ספר לרופא אם אתה נוטל azathioprine (אזאטיופרין) או 6-mercaptopurine (6-mercaptopurine) ודח עם יומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל.

בנוסף, נצפו מקרים של סרטן העור שאינו מלנומה אצל מטופלים הולקחים אדאלימומאב. יש לספר לרופא אם במהלך הטיפול ביומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל או אחריו מופיעים נגעים עוריים חדשים או אם לך שינוי בנגעים קיימים.

דווחו מקרים של מחלות סרטן שאינן לימפומה אצל מטופלים שנטלו חסם TNF אחר ואשר חולים במחלות ריאות חיסמיתת כרונית (COPD - Chronic Obstructive Pulmonary Disease).

אם אתה סובל מחלות ריאות חיסמיתת כרונית, או אם אתה מעשן כבד, עליך להיוועץ ברופא אצל מטפל בחסם TNF מידע נוסף.

⚠ יחסים בילדים ומתבגרים

חיסונים: במידת האפשר, ילדים צריכים לקבל את כל החיסונים הנדרשים על-פי הנחיות החיסון הנוכחיות לפני תחילת הטיפול ביומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל.

כיוון ששטשר הימינון בילדים הינו תלוי משקל, ולאור העובדה שלא ניתן לתת מינון חלקי מהמזרק המוכן להזרקה רחי שאין להשתמש במינון זה מ"ל מזרק מוכן להזרקה בילדים הזקוקים לפחות מ- 40 מ"ל במנה.

לצורך מתן אדאלימומאב בילדים קיים מוצר בשם **יומירה 40 מ"ג, בבקבוקון**.

⚠ אם אתה לוקה, או אם לוקחת לאחרונה, תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר לך לרופא או לרוקח.

אין ליטול יומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל עם תרופות המכילות את החומרים הפעילים:

- אנאקטאפט (anakinra)
- אבאטאקאפט (abatacept)
- תרופות אלו משמשות לטיפול בדלקת מפרקים שגרנית.
- ניתן ללקח יומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל יחד עם** מתוסטרקסאט (methotrexate)
- תרופות אחרות לטיפול בדלקת מפרקים (למשל לפלנומיד (leflunomide), סולפסלאזין (sulfasalazine), הידרוקסיכלורוקוין (hydroxychloroquine), ותכשירי זרב (הזרקה) או סטרואידים או נוגדי כאבים, כולל תרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידיות (NSAIDs).

אם יש לך שאלות, שאל את הרופא.

מכיוון שיומירה ניתנת בהזרקה בת-עורית, אוכל ושתייה אינם משפיעים על התרופה.

ההיריון והתורה

השפעת התרופה בנשים בהריון אינה ידועה ועל כן לא מומלץ להשתמש ביומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל בזמן הריון.

מומלץ להימנע מהיכנס להריון וחובה להשתמש באמצעי מניעה אחרים בזמן הטיפול ביומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל. יש לבמשך לפחות 5 חודשים לאחר הטיפול האחרון ביומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל.

יש להיוועץ ברופא במידה ונכנסת להריון במהלך הטיפול ביומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל. אם נטלת יומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל במהלך ההריון, התינוק עלול להיות בסיכון מוגבר לזיהומים. לפני שתינוקך מקבל חיסונים כלשהם, חשוב לעדכן את רופא הילדים המטפל בתינוקך ואת הצוות הרפואי במרפאה ובסיפת חלב כי נטלת יומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל במהלך ההריון (ראה מידע נוסף בסעיף "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה" בפסקה הדנה בחיסונים).

כל ידוע אם אדאלימומאב, החומר הפעיל ביומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל, משפיר בחלב אם. אין להניק במשך כל תקופת הטיפול בתרופה ולפחות 5 חודשים לאחר הטיפול האחרון. אם את חושבת שאת בהריון או את מתכננת הריון, היוועץ ברקוח או ברופא לפני נטילת תרופה זו.

ליהגיה ושימוש במכונות

ביומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל עלולה להיות השפעה זעירה על היכולת לנהוג. לרכב על אופניים או להפעיל מכונות. לאחר טיפול ביומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל ייתכן תחושת סחרחורת ופריחה בראייה.

⚠ הערות נוספות

אם אתה מעשן כבד, עליך להיוועץ ברופא המטפל האם הטיפול בחסם TNF מתאים לך (ראה מידע נוסף בסעיף "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה").

3) כיצד תשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי ההוראות האחרות.

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

אין להשתמש ביומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל מזרק מוכן להזרקה בילדים הזקוקים לפחות מ- 40 מ"ג במנה

המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא המטפל בלבד.

אין לעבור על המנה המומלצת.

יומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל מזורקת מתחת לעור (שימוש תת-עורי).

להוראות מפורטות על אף להזריק יומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל - ראה סעיף 7 'הזרקת יומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל – הוראות שימוש'.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

אם בטעות הזרקת יומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל מ"ל לעיתים קרובות יותר מכפי שהרופא המטפל או הרוקח הורה לך, עליך להתקשר לרופא או לרוקח ולדווח לו על כך. לפגישתך עם הרופא או במידה ותרדש לפנות לחדר מיון של בית חולים, תמיד הבא את אריזת התרופה איתך, גם אם היא ריקה.

אם שכחת להזריק יומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל
עליך להזריק את המנה מיד כשתזכר. לאחר מכן, הזרק את המנה הבאה על-פי התכנון המקורי, אם לא היית שוכח מנה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אם הפסקת ליטול יומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל

יש לזמן עם הרופא בנוגע להפסקת נטילת יומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל. ייתכן והתסמינים שיש להם סבלת בעבר יחזרו עם הפסקת נטילת יומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל.

אין ליטול תרופות נוספות בחוּשָׁן בודק התוויות והמנה **בכל פעם** שהנך נוטל תרופה. פריים משקלם ואין לך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בתכשיר עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. לא תיבהל להזריק רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

רוב תופעות הלוואי הן קלות עד בינוניות. עם זאת, חלק מתופעות הלוואי עלולות להיות חמורות ולהצריך טיפול.

תופעות לוואי עלולות להתרחש עד 4 חודשים לפחות אחרי הטיפול האחרון ביומירה 40 מ"ג/0.4 מ"ל.

יש לפנות מיד לרופא אם אתה מבחין באחד מהתסמינים הבאים:

- פריחה חמורה, ספרדת או סימנים אחרים לתגובה אלרגית
- נפיחות בפנים, בידים או בכפות הרגליים
- קשיי נשימה, קשיי בליעה
- קוצר נשימה במאמץ או באכילה או התנפחות של כפות הרגליים
- יש לפנות לרופא במקרה האפשרי** אם אתה מבחין באחד מהתסמינים הבאים:
 - סימנים ופגיעות עם זיהום, כגון: חום, בחילה, פצעים, בעיות נשיניים, צריבה בעת מתן שתן
 - תחושת חולשה או עייפות
 - הסחה כחולה או יציפות
 - קעקוע
 - דווח תחושה
 - אזויר תפולה
 - חולשה בזרוע או ברגל
 - חבורה או נפגעים פתוח שאינם מגלים
- סימנים ותסמינים המעידים על מחלה כגון: חום, בחילה, פצעים, בעיות נשיניים, צריבה בעת מתן שתן
- תחושת חולשה או יציפות
- קעקוע
- דווח תחושה
- אזויר תפולה
- חולשה בזרוע או ברגל
- חבורה או נפגעים פתוח שאינם מגלים

התסמינים שתוארו לעיל יכולים להיות סימנים של תופעות הלוואי שלהלן, שנצפו בעת השימוש בתכשיר:

תופעות לוואי שכיחות מאוד (תופעות שמופיעות ביותר ממשתמש אחד מעשרה):

- תגובות באזור ההזרקה (כולל כאב, נפיחות, אדמומיות או גרד)
- זיהומים בדרכי הנשימה (כולל התקררות, מלת, זיהום בסינוסים, דלקת ריאות)
- כאב ראש
- כאב בטן
- בחילה והקאה
- פריחה
- כאבים בשרירי השלד
- תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות ב- 10-100 משתמשים מתוך 100):**
 - זיהומים חמורים (כולל אלח דם ושפעת)
 - זיהומים בעור (כולל צלוליטיס, שלבלק חוגורת)
 - זיהומים באוזניים
 - זיהומים בחלל הפה (כולל זיהומים בשיניים ופצעי קור)
 - זיהומים במערכת הריביה
 - זיהום בדרכי השתן
 - זיהומים פטרייתיים
 - זיהומים במפרקים
 - גיודלים שפירים
 - סרטן העור
- תגובות אלרגיות (כולל אלרגיה עונתית)
- התייבשות
- שינויים במצב הרוח (כולל דיכאון)
- חרדה
- קשיים בשינה

- הפרעות בתחושה, כגון: תחושה של עקצוץ, דקירה או העדר תחושה מיגרה
- לחץ על שורש העצב (כולל כאבי גב תחתון וכאבי רגליים)
- הפרעות בראייה
- דלקת עיניים
- דלקת של העפעף ונפיחות העין
- ורטיגו (תחושת סחרחורת)
- תחושה של דפיקות לב מהירות
- לחץ דם גבוה
- סומק
- שטף דם
- שיעול
- אסטמה
- קוצר נשימה
- דימום בקריבה ובמעי
- הפרעה בעיכול (קושי בעיכול, נפיחות, צרבת)
- רפלוקס חומצי
- הסמנות סיסיה (כולל יובש בעיניים ויובש בפה)

- גרד
- פריחה מגודרת
- חבורות
- דלקת בעור, כגון: אקזמה
- שברית ציפורניים בכפות הידיים ובבהונות
- הזעה מוגברת
- נשירת שיער
- התחלה או חמורה של ספחת (פסוריאזיס)
- התכווצויות שרירים
- דם בשתן
- בעיות כליותיות
- כאב בחזה
- בצקת
- חום
- ירידה במספר טסיות הדם כך שהסיכוי לדימומים ולחבורות גדל

תופעות לוואי שאינן שכיחות (תופעות שמופיעות ב- 10-100 משתמשים מתוך 1,000):

- זיה