

דיאמילה

טבליות מצופות

חומר פעיל

כל טבליה מכילה: Desogestrel 0.075 mg (דסוגסטרל 0.075 מ"ג)
חומרים בלתי פעילים ואלרגניים: ראי פרק 6 "מידע נוסף". ראי גם "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" בפרק 2.

קראי בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמשי בתרופה.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על **דיאמילה**. אם יש לך שאלות נוספות, שאלי את הרופא או הרוקח שלך.
תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעבירי אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה כי מצבם הרפואי דומה לשלך.
התרופה אינה מיועדת לילדות ומתבגרות מתחת לגיל 18.

1. למה מיועדת התרופה?

דיאמילה משמשת למניעת היריון.

קיימים 2 סוגים עיקריים של אמצעי מניעה הורמונליים.
- גלולה משולבת, נקראת "הגלולה", מכילה שני סוגים של הורמון מין נקבי: אסטרוגן פרוגסטוגן.
- גלולה המכילה פרוגסטוגן בלבד (POP-progestogen only pill), אינה מכילה אסטרוגן.

דיאמילה היא גלולת פרוגסטוגן - בלבד.

דיאמילה מכילה כמות קטנה של סוג אחד של הורמון מין נקבי, פרוגסטוגן **דסוגסטרל**.
רוב הגלולות המכילות פרוגסטוגן בלבד פועלות בעיקר באמצעות מניעת חדירת תאי זרע לרחם, אך לא תמיד מונעות הבשלה של הביצית, שהיא הפעולה העיקרית של גלולות משולבות.
דיאמילה נבדלת מרוב הגלולות המכילות פרוגסטוגן בלבד בכך שהמיון שלה ברוב המקרים גבוה מספיק על מנת למנוע הבשלה של ביצית. כתוצאה מכך, **דיאמילה** מספקת יעילות גבוהה במניעת היריון.
בניגוד לגלולות המשולבות, ניתן לעשות שימוש ב**דיאמילה** בנשים שאינן יכולות ליטול אסטרוגן ובנשים מיניקות.
חסרונה הוא בכך שבמהלך שימוש בה ייתכן דימום וגילי בלתי סדיר. מצד שני, ייתכן שלא תחוו דימום כלל.

קבוצה תרפויטית: פרוגסטוגנים, אמצעי מניעה הורמונליים.

2. לפני שימוש בדיאמילה

דיאמילה, כמו אמצעי מניעה הורמונליים אחרים, אינה מגינה מפני הידבקות ב-HIV (אידס) או כל מחלה אחרת המועברת במגע מיני.

אין להשתמש בדיאמילה אם:

- את רגישה (**אלרגית**) לדזוגסטרל (החומר הפעיל), לבוטנים, לסויה, או לכל אחד מהמרכיבים האחרים אשר מכילה התרופה (לרשימת המרכיבים הבלתי פעילים, ראי פרק 6).
- את סובלת מפקקת. פקקת הינה היווצרות של **קריש דם** בכלי דם [לדוגמא: של הרגליים (פקקת ורידים עמוקים) או הריאות (תסחיף ריאתי)].
- יש לך או הייתה לך **צהבת** (הצהבה של העור) או מחלת כבד חמורה ותפקוד הכבד שלך טרם חזר למצב תקין.
- את סובלת או שקיים חשש **לסרטן** הרגיש להורמוני-מין, כגון סוגים מסוימים של סרטן השד.
- יש לך **דימום וגילי בלתי מוסבר**.

ספרי לרופא שלך לפני התחלת השימוש ב**דיאמילה** במידה שאחד המצבים האלה מתייחס אליך. הרופא עשוי לייעץ לך להשתמש בשיטה לא הורמונלית למניעת היריון.
עליך להיוועץ ברופא באופן מיידי אם אחד מהמצבים האלו מופיע בפעם הראשונה בעת השימוש ב**דיאמילה**.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה לפני הטיפול בדיאמילה, ספרי לרופא שלך אם:

- חלית אי פעם בסרטן השד.
 - יש לך סרטן כבד, מאחר שלא ניתן לשלול השפעה אפשרית של דיאמילה.
 - סבלת אי פעם מפקקת.
 - יש לך סוכרת.
 - את סובלת מאפילפסיה (ראי סעיף 'נטילת תרופות אחרות').
 - את סובלת משחפת (ראי סעיף 'נטילת תרופות אחרות').
 - יש לך לחץ דם גבוה.
 - את סובלת או סבלת בעבר מכלואזמה (כתמי פיגמנטציה בצבע חום-צהבהב על העור, במיוחד בפנים); במקרה זה, הימנעי מחשיפה מוגברת לשמש או לקרינה אולטרה-סגולה.
- כאשר נעשה שימוש בדיאמילה בנוכחות של אחד מהמצבים האלו, ייתכן שתצטרכי להיות תחת השגחה צמודה. הרופא שלך יכול להסביר מה לעשות.

סרטן השד

חשוב לבדוק באופן קבוע את השדיים שלך ולפנות לרופא בהקדם האפשרי אם את מרגישה גוש כלשהו בשדיים. סרטן השד התגלה בתדירות מעט גבוהה יותר בנשים הנוטלות גלולות לעומת נשים באותו גיל אשר אינן נוטלות גלולות. כאשר הנשים מפסיקות את השימוש בגלולה, הסיכון יורד בהדרגה, כך ש-10 שנים לאחר הפסקת השימוש, הסיכון זהה לזה של נשים שמעולם לא נטלו גלולות. סרטן השד הינו נדיר מתחת לגיל 40, אך הסיכון גדל ככל שהאישה מתבגרת. לכן, מספר מקרי סרטן השד הנוספים המאובחנים גבוה יותר אם אישה ממשיכה לקחת את הגלולה בגיל מבוגר יותר. משך הזמן בו היא לוקחת את הגלולה הוא פחות חשוב.

- מתוך 10,000 נשים הנוטלות את הגלולה לתקופה של עד 5 שנים אך מפסיקות לקחת אותה עד גיל 20, יהיה פחות ממקרה 1 נוסף של סרטן השד שנמצא עד 10 שנים לאחר ההפסקה, בנוסף ל-4 מקרים המאובחנים בדרך כלל בקבוצת גיל זו.
- מתוך 10,000 נשים הנוטלות את הגלולה לתקופה של עד 5 שנים אך מפסיקות לקחת אותה עד גיל 30, יהיו 5 מקרים נוספים בנוסף ל-44 מקרים המאובחנים בדרך כלל.
- מתוך 10,000 נשים הנוטלות את הגלולה לתקופה של עד 5 שנים, אבל מפסיקות לקחת אותה עד גיל 40, יהיו 20 מקרים נוספים בנוסף ל-160 מקרים המאובחנים בדרך כלל.

מניחים כי הסיכון לסרטן השד בקרב משתמשות בגלולות המכילות פרוגסטוגן בלבד כמו דיאמילה דומה לזה שבקרב נשים המשתמשות בגלולות משולבות, אך ההוכחות פחות חד משמעיות.

נראה כי סרטני השד הנמצאים אצל נשים הנוטלות גלולות, סבירותם להתפשט נמוכה יותר מזו של סרטני השד שנמצאים בנשים אשר אינן נוטלות גלולות. אין זה וודאי שהגלולה גורמת לעלייה בסיכון לסרטן השד. ייתכן שהנשים נבדקו לעתים קרובות יותר, כך שסרטן השד התגלה מוקדם יותר.

פקקת

יש לגשת לרופא מייד, אם את מבחינה בסימנים אפשריים של פקקת (ראי גם 'בדיקות ומעקב'). פקקת הינה היווצרות של קריש דם, אשר עלול לחסום כלי דם. פקקת לפעמים נוצרת בוורידים העמוקים של הרגליים (פקקת ורידים עמוקים). אם קריש זה מתנתק מהוורידים בהם הוא נוצר, הוא יכול להגיע ולחסום את העורקים של הריאות, ולגרום ל"תסחיף ריאתי". תסחיף ריאתי יכול לגרום לכאב בחזה, קוצר-נשימה, התמוטטות או אפילו מוות.

- פקקת ורידים עמוקים הינה תופעה נדירה. היא יכולה להתפתח בין אם את לוקחת את הגלולה או לא. היא עלולה להתרחש גם אם את נכנסת להריון.

הסיכון גבוה יותר בקרב משתמשות בגלולה מאשר בקרב הלא משתמשות. מניחים כי הסיכון בשימוש בגלולות המכילות פרוגסטוגן בלבד, כמו דיאמילה, הוא נמוך יותר מאשר בשימוש בגלולות המכילות גם אסטרוגנים (גלולות משולבות).

ילדות ומתבגרות

התרופה אינה מיועדת לילדות ונערות מתבגרות מתחת לגיל 18 מכיוון שאין נתונים קליניים זמינים על יעילות

אם את לוקחת או לקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם רופא ותוספי תזונה, ספרי על כך לרופא המטפל או לרוקח. במיוחד אם את לוקחת:

תרופות מסוימות אשר עלולות להפסיק את הפעילות התקינה של **דיאמילה**. אלו כוללות תרופות המשמשות לטיפול ב:

- אפילפסיה (לדוגמה פרימידון, פניטואין, קארבאמאזפין, אוקסקארבאזפין, פלבמאט ופנובארביטאל)
- שחפת (לדוגמה ריפאמפיצין)
- זיהומי HIV (לדוגמה ריטונביר), או מחלות זיהומיות אחרות (לדוגמה גריסאופולבין)
- קלקול קיבה (פחם רפואי)
- מצבי רוח דיכאוניים (התרופה הצמחית St. John's wort)

הרופא שלך יכול להגיד לך אם את צריכה לנקוט באמצעי זהירות נוספים למניעת היריון, ואם כן, לכמה זמן.

דיאמילה עלולה גם להפריע לפעילות של תרופות מסוימות, לגרום להגברה בהשפעה (לדוגמה תרופות המכילות ציקלופורין) או לירידה בהשפעה.

שימוש בתרופה ומזון
ניתן לקחת **דיאמילה** ללא קשר לאוכל.

היריון והנקה

היריון

אין ליטול **דיאמילה** אם הינך בהיריון, או חושבת שאת עשויה להיות בהיריון.

הנקה

ניתן להשתמש ב**דיאמילה** בזמן הנקה. **דיאמילה** אינה משפיעה על ייצור או איכות חלב האם. עם זאת, כמות מועטה של החומר הפעיל ב**דיאמילה** עוברת אל החלב.

בראותם של ילדים אשר הונקו במשך 7 חודשים כאשר אימהותיהם השתמשו ב**דיאמילה** נחקרה עד הגיעם לגיל שנתיים וחצי. לא נצפו שום השפעות על גדילתם והתפתחותם של הילדים.

אם הינך מיניקה ורוצה להשתמש ב**דיאמילה**, עלייך להתייעץ עם הרופא.

נהיגה ושימוש במכונות

לא ידועה השפעה כלשהי של השימוש ב**דיאמילה** על היכולת לנהוג או להפעיל מכונות.

מידע חשוב בנוגע לחלק מהמרכיבים של דיאמילה

דיאמילה מכילה לקטוז (סוכר חלב) ושמן סויה.

אם נאמר לך ע"י הרופא כי את רגישה לסוכרים מסוימים, פני לרופא לפני נטילת **דיאמילה**.
אם את אלרגית לבוטנים או לסויה, אין להשתמש בתכשיר זה.

יש לפנות לרופא בהקדם האפשרי אם:

- את מבחינה בסימנים אפשריים לקריש דם, לדוגמה כאב חזק או נפיחות באחת מהרגליים, כאבים לא מוסברים בחזה, קוצר נשימה, שיעול יוצא דופן, במיוחד שיעול דמי (דבר שעלול להצביע על פקקת);
- יש לך כאב בטן חריף ופתאומי או צהבת (את עשויה להבחין בהצהבה של העור, הלבן של העיניים, או שתן כהה, עלול להצביע על בעיות בכבד);
- את מרגישה גוש בשד (עלול להצביע על סרטן השד);
- יש לך כאב פתאומי או חריף בבטן התחתונה או באזור הקיבה (עלול להצביע על היריון אקטופי, שהנו היריון מחוץ לרחם);
- את עומדת להיות במצב של חוסר תנועה או שאת עומדת לעבור ניתוח (יש להיוועץ ברופא לפחות ארבעה שבועות מראש);
- יש לך דימום נרתיקי חזק באופן חריג;
- את חושדת שאת בהיריון.

3. כיצד תשתמשי בדיאמילה?

תמיד יש ליטול **דיאמילה** לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוחה. המינון, אופן ומשך הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. אין לעבור על המנה המומלצת.

איך ומתי ליטול את הגלולות?

אריזת דיאמילה מכילה 28 גלולות. ימי השבוע מודפסים על המגשית. כמו-כן מודפסים חיצים המסמנים את הסדר שבו יש לקחת את הגלולות. כל יום מתאים לגלולה אחת. בכל פעם שאת מתחילה אריזה חדשה של דיאמילה, קחי גלולה מהשורה העליונה. אל תתחילי מכל גלולה שהיא. למשל, אם את מתחילה ביום רביעי, עלייך לקחת גלולה מהשורה העליונה שבה כתוב WED (= יום רביעי). המשיכי ליטול גלולה אחת ליום עד שהאריזה תתרוקן, תמיד בכיוון המצוין על ידי החיצים. בהסתכלות על מגשית הגלולות תוכלי לבדוק בקלות אם כבר נטלת גלולה ביום מסוים.

טלי את הגלולה באותה שעה בכל יום. בלעי אותה בשלמותה, עם מים.

ייתכן שיהיה לך דימום נרתיקי במהלך השימוש בדיאמילה, (ראי פרק 4, תופעות לוואי), אך עליך להמשיך ליטול את הגלולות כרגיל.

כאשר החפיסה הסתיימה, עלייך להתחיל אריזה חדשה של דיאמילה ביום שלמחרת - ללא הפסקה ומבלי להמתין לדימום.

התחלת החפיסה הראשונה של דיאמילה

- **אם אינך משתמשת באמצעי מניעה הורמונלי כרגע (או בחודש האחרון):**
המתיני עד אשר תופיע הווסת. ביום הראשון לווסת טלי את הגלולה הראשונה של דיאמילה. אינך זקוקה לאמצעי מניעה נוסף. אם את נוטלת את הגלולה הראשונה ביום השני עד היום החמישי לווסת, יש להשתמש באמצעי מניעה נוסף (שיטת חציצה) למשך שבוע מרגע התחלת השימוש בדיאמילה.
- **כאשר את עוברת מגלולה משולבת, טבעת וגינלית, או מדבקה טרנסדרמלית:**
את יכולה להתחיל ליטול דיאמילה יום לאחר שנטלת את הגלולה האחרונה באריזת הגלולות הנוכחית, או ביום הסרת הטבעת הוגינלית או המדבקה (כלומר ללא הפסקה בין הגלולות, הטבעת הוגינלית או המדבקה לבין התחלת דיאמילה).
אם אריזת הגלולות הנוכחית שלך מכילה גם גלולות לא פעילות, את יכולה להתחיל את השימוש בדיאמילה ביום שלאחר נטילת הגלולה הפעילה האחרונה (אם אינך בטוחה איזו גלולה זו, פני לרופא או לרוקח).
- **אם תמלאי אחר הוראות אלה אינך צריכה להשתמש באמצעי מניעה נוסף.**
- את יכולה גם להתחיל ליטול דיאמילה לכל המאוחר עם תום שבוע ההפסקה בגלולות, טבעת וגינלית, מדבקה או לאחר השימוש בגלולות הפלצבו של אמצעי המניעה הנוכחי שלך.
- **אם את פועלת על פי הנחיות אלו, ודאי כי את משתמשת באמצעי מניעה נוסף (שיטת חציצה) במהלך השבוע הראשון לשימוש בדיאמילה.**
- **כאשר את עוברת מגלולות פרוגסטוגן-בלבד אחרת:**
את יכולה להפסיק ליטול אותה בכל יום ולהתחיל מיד בנטילת דיאמילה. אינך זקוקה לאמצעי מניעה נוסף.
- **כאשר את עוברת מזריקה או משתל או מהתקן תוך-רחמי הורמונלי:**
התחילי בנטילת דיאמילה במועד בו את אמורה לקבל את הזריקה הבאה, או ביום בו מוסר השתל או ההתקן התוך-רחמי ההורמונלי. אינך זקוקה לאמצעי מניעה נוסף.
- **לאחר לידה:**
את יכולה להתחיל את השימוש בדיאמילה בין היום ה-21 ליום ה-28 לאחר הלידה. אם את מתחילה מאוחר יותר, ודאי כי את משתמשת באמצעי מניעה נוסף (שיטת חציצה) במהלך השבוע הראשון לשימוש בדיאמילה. אבל, אם כבר קיימת יחסי מין - יש לשלול היריון לפני התחלת השימוש בדיאמילה. ניתן למצוא מידע עבור נשים מיניקות בסעיף 'היריון והנקה'. תוכלי גם להיוועץ ברופאך.

- **לאחר הפלה:**
היוועצי ברופאך.

בדיקות ומעקב

במהלך השימוש בדיאמילה, הרופא יפנה אותך לבדיקות תקופתיות. באופן כללי, תדירות וסוג הבדיקות יקבעו על פי מצבך האישי.

אם נטלת יותר דיאמילה מכפי שהיית צריכה

לא היו דיווחים על השפעות מזיקות חמורות בנטילת יותר מדי גלולות דיאמילה בו-זמנית. תסמינים העלולים

להופיע הינם בחילות, הקאות. למידע נוסף, היוועצי ברופאך.
אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, יש לפנות מיד לחדר מיון של בית חולים ולהביא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול דיאמילה בזמן הדרוש

- אם עברו פחות מ-12 שעות מזמן נטילת הגלולה:
טלי את הגלולה מיד כשנזכרת והמשיכי בנטילת שאר הגלולות בזמן הרגיל. דיאמילה עדיין תגן עלייך מפני היריון.
- אם עברו יותר מ-12 שעות מזמן נטילת גלולה כלשהי:
- **ייתכן שלא תהיי מוגנת לחלוטין מפני היריון.** ככל ששכחת מספר רב יותר של גלולות עוקבות, כך גדל הסיכון להיריון.
- טלי גלולה מיד כשנזכרת ואת הגלולות הבאות בזמן הרגיל. המשמעות יכולה להיות לקיחת שתי גלולות באותו יום. הדבר אינו מזיק (אם שכחת יותר מגלולה אחת אינך צריכה לקחת את הגלולות הקודמות שנשכחו). המשיכי לקחת את הגלולות כרגיל אבל עלייך להשתמש גם באמצעי מניעה נוסף, כגון קונדום, במשך **7 ימים הבאים**.
- אם עברו יותר מ-12 שעות מזמן נטילת הגלולה וקיימת יחסי מין, ניתן להשתמש באמצעי מניעה לשעת חירום. היוועצי ברופא או ברוקח.
- אם שכחת גלולה אחת או יותר **במהלך השבוע הראשון** לנטילת דיאמילה, וקיימת יחסי מין בשבוע שקדם לשיכחה קיים סיכון כי נכנסת להיריון. במקרה זה היוועצי ברופאך.

אם את מקיאה או משתמשת בפחם רפואי

אם הקאת או השתמשת בפחם רפואי בתוך 3-4 שעות לאחר נטילת דיאמילה או אם יש לך שלשול חריף, ייתכן שהמרכיב הפעיל לא נספג במלואו. עקבי אחרי ההנחיות לגבי גלולות שנשכחו בסעיף הקודם.

אם את מפסיקה ליטול דיאמילה

את יכולה להפסיק ליטול דיאמילה בכל עת שתחפצי. מהיום בו הפסקת, אינך מוגנת עוד מפני היריון.
אין ליטול תרופות בחושך! יש לבדוק התוויות והמנה בכל פעם שהינך נוטלת תרופה. יש להרכיב משקפים אם הינך זקוקה להם.
אם יש לך שאלות נוספות כלשהן בנוגע לשימוש בתרופה, שאלי את הרופא או הרוקח שלך.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בדיאמילה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשות. אל תיבהלי למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבלי מאף אחת מהן.
תופעות לוואי חמורות הקשורות לשימוש בדיאמילה מתוארות תחת סעיף 'אזהרות מיוחדות בנוגע לשימוש בתרופה' בפרק 2. אנא קראי פרק זה לקבלת מידע נוסף בנושא 'סרטן השד' ו'פקקת', והיוועצי ברופאך במידת הצורך. ראי גם סעיף 'יש לפנות לרופא בהקדם האפשרי אם'.
דימום וגנילי בלתי סדיר עלול להופיע בעת שימוש בדיאמילה. זו יכולה להיות הכתמה קלה, שאף לא דורשת שימוש בתחבושת, או דימום חזק יותר, אשר נראה כמו וסת קלה ודורש שימוש בתחבושות היגייניות או בטמפונים. יתכן שלא יהיה לך דימום כלל. הדימום הלא סדיר אינו מהווה סימן לירידה ביעילות ההגנה נגד היריון של דיאמילה. באופן כללי, אין צורך לנקוט בפעולה כלשהי; עליך להמשיך את השימוש בדיאמילה כרגיל. **אם הדימום כבד או ממושך - היוועצי ברופאך.**

יש לפנות לרופא מיד אם הינך מפתחת כל אחד מהסימנים הבאים:

- תסמינים של אנגיזאדמה, כגון נפיחות בפנים, בלשון או בלוע; קשיי בליעה; או חרלת וקשיי נשימה.

תופעות לוואי נוספות

משתמשות בדיאמילה דיווחו על תופעות הלוואי הבאות:

תופעות לוואי שכיחות (מופיעות ב-10-1 משתמשות מתוך 100):

- שינוי במצב הרוח, מצב רוח דיכאוני, ירידה בחשק המיני (ליבידו)
- כאבי ראש
- בחילה
- אקנה
- כאב בשד, מחזור לא סדיר או היעדר מחזור

- עליה במשקל הגוף
- תופעות לוואי שאינן שכיחות (מופיעות ב-10-1 משתמשות מתוך 1,000):

- זיהום וגנלי
- קושי בהרכבת עדשות מגע
- הקאות
- נשירת שיער
- כאבי מחזור, ציסטות בשחלה
- עייפות

תופעות לוואי נדירות (מופיעות ב-10-1 משתמשות מתוך 10,000):

- תופעות עוריות כגון פריחה, חרלת, גבשושיות מכאיבות בעור בצבע כחול-אדום (אריתמה נודוזום). פרט לתופעות לוואי אלה, תיתכן הפרשה או דליפה מהשדיים.
- אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר את סובלת מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:
<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@mo.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנעי הרעלה! תרופה זו, כמו כל תרופה אחרת, יש לשמור במקום בטוח מחוץ להישג ידם וראייתם של ילדים ו/או תינוקות, ועל ידי כך תמנעי הרעלה. אל תגרמי להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בדיאמילה לאחר תאריך התפוגה (exp. date) אשר מצויין על האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של החודש המצויין.
- **תנאי אחסון:** יש לאחסן מתחת ל- 25°C.
- אין להשליך תרופות לביוב או לפח אשפה ביתי. שאלו את הרוקח איך להשליך תרופות שאינן בשימוש עוד. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

מה דיאמילה מכילה?

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Lactose monohydrate, maize starch, povidone K-30, stearic acid, silica colloidal anhydrous, silica colloidal hydrated, RRR- alpha-Tocopherol, hypromellose 2910, polyethylene glycol, titanium dioxide.

כל טבליה מכילה 55 מ"ג לקטוז מונוהידראט.

ראי גם סעיף 'מידע חשוב בנוגע לחלק מהמרכיבים של דיאמילה'.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

הטבליה הינה לבנה ועגולה.

גודל האריזה: קופסת קרטון המכילה בליסטר אחד או שלושה. כל בליסטר מכיל 28 טבליות ועשוי להיות ארוז בנרתיק נפרד.
 ייתכן שלא כל סוגי האריזות ישווקו

בעל הרישום:

דיפריס ושות' בע"מ, רח' הברזל 32, תל-אביב

היצרן:

Actavis Group PTC ehf, IS-220 Hafnar-ordur, Iceland

עלון זה נבדק ואושר על ידי משרד הבריאות ב: 10.05.2016

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 155-98-34400