



## **BEPANTHEN PLUS CREAM (127 48 26501 01)**

רופא/ה יקר/ה, רוקח/ת יקר/ה,

חברת באייר ישראל בע"מ מבקשת להודיעכם על מספר עדכונים בעלון לצרכן של התכשיר בפנטן פלוס. בהודעה זו מצוינים הסעיפים בהם נעשה שינוי המהווה החמרה, קיימים עדכונים נוספים.

### **ההתוויות המאושרות לתכשיר:**

Antiseptic healing treatment of wounds of any kind with an infection risk: such as slight skin irritations, wounds, cuts, burns and skin inflammation.

### **מרכיבים פעילים:**

DEXPANTHENOL 5 %  
CHLORHEXIDINE HYDROCHLORIDE 0.5 %

### **הסבר:**

טקסט עם קו תחתני מציין טקסט שהוסף לעלון.

### **אין להשתמש בתרופה אם:**

- אתה רגיש (אלרגי) לדקספנטנול, כלורקסידין דיהידרוכלוריד או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה.
- אין למרוח תכשיר זה על עור תוף מנוקב.
- אין להשתמש בבפנטן פלוס לפצעים עמוקים, חמורים או מזוהמים. טיפול בפצעים אלו יתבצע על ידי הרופא.

### **אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה**

- לפני הטיפול בבפנטן פלוס ספר לרופא אם:**
  - הנך סובל ממחלה כלשהי.
  - הנך סובל מאלרגיות, רגיש לחומר כלשהו או לתרופה כלשהי.
- יש להימנע ממגע עם העיניים, האוזניים ורקמות ריריות.
- שימוש חוזר באותו שטח עור עלול להוביל לגירוי העור.
- בפנטן פלוס מתאים לשימוש על שטחי עור מצומצמים בלבד. יש להימנע משימוש על שטחי עור נרחבים.
- פצעים נרחבים, עמוקים, חמורים או מזוהמים וכן עקיצות/נשיכות ופצעי דקירה דורשים פנייה לרופא/טיפול רפואי בגלל החשש לזיהום טטנוס.
- יש לפנות לרופא במידה וגודל הפצע איננו קטן לאחר זמן מה או במידה והפצע איננו מחלים בתוך 10-14 יום. הדבר נכון גם לגביי פצע בעל שוליים אדומים מאוד, במידה והפצע מתנפח או מאוד כואב וכן במידה והפצע מלווה בחום (קיים סיכון לתגובה מערכתית לזיהום חיידקי חמור-ספסיס).
- אין להשתמש בתכשיר לטיפול בגירויים אשר הסיכון שיזדהמו נמוך (לדוגמא: כוויות שמש).

באייר ישראל בע"מ

רח' החרש 36 ת.ד. 7325 הוד השרון 45240 ישראל

טלפון: 09-7626700 פקס: 09-7626730

www.bayerhealthcare.com



#### **תגובות בין תרופתיות:**

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם, תרופות למריחה על גבי העור ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.  
אין להשתמש באזור המטופל בבפנטן פלוס, בו זמנית גם בסבונים, דטרגנטים וחומרים מחטאים אחרים.

#### **הריון והנקה:**

אם הינך בהריון או מניקה היועצי ברופא או ברוקח לפני הטיפול בבפנטן פלוס. יש להימנע משימוש על שטחי עור נרחבים.

#### **אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר עלולה להופיע עלייה באנזימי כבד.**

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

#### **תופעות לוואי:**

כמו בכל תרופה, השימוש בבפנטן פלוס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

#### **יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא אם מופיעים:**

- תגובות אלרגיות כגון דלקת עור הקשורה למגע עם חומר, דלקת עור אלרגית, גרד, אודם, אקזמה, פריחה, חרלת (אורטיקריה), גירוי העור, תחושת בעירה או שלפוחיות.
- תגובת רגישות יתר, תגובה אנפילקטית, שוק אנפילקטי הכולל ביטויים מעבדתיים וקליניים כגון אסתמה. תגובות של העור, מערכת הנשימה, מערכת העיכול, או ליקוי במערכת הנשימה, הלב וכלי הדם.
- עלייה באנזימי כבד - עלולה להופיע לאחר נטילת מינון יתר. ראה גם סעיף 3- "אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר".

העלון לצרכן מפורסם במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות:

<http://abush.health.gov.il/units/pharmacy/trufot/index.asp>

ניתן לקבלו מודפס ע"י פניה לחברת באייר ישראל, רח' החרש 36 הוד השרון 09-7626700.

בברכה,

אלינה ורמן  
רוקחת ממונה