

מגאקסין טבליות

טבליות מצופות

כל טבליה מכילה:

מוקסיפלוקסאצין (כהידרוכלוריד) 400 מ"ג 400 Moxifloxacin (as hydrochloride).

חומרים בלתי פעילים ואלרגנים: ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 18 שנים. לא ידוע אם מגאקסין טבליות בטוח ויעיל במטופלים מתחת לגיל 18 שנים. ילדים נמצאים בסיכון גבוה יותר לפתח בעיות בגידים, בעצמות ובמפרקים, עקב נטילת אנטיביוטיקה מקבוצת הפלואורוקווינולונים.

מידע חיוני על התרופה

מגאקסין טבליות הינה אנטיביוטיקה ממשפחת הפלואורוקווינולונים. תרופה זו עלולה לגרום לתופעות לוואי העלולות להיות חמורות ואף להוביל למוות. אם מופיעה אצלך אחת מתופעות הלוואי החמורות המפורטות להלן, קבל טיפול רפואי בהקדם האפשרי והיוועץ ברופא האם להמשיך ולקחת מגאקסין טבליות.

1. קריעה או התנפחות של הגיד, דלקת בגיד (גידים הם רצועות חזקות המחברות בין השרירים לעצמות).
2. שינויים בתחושה ונזק עצבי אפשרי (ניורופתיה עצבית היקפית).
3. השפעה על מערכת העצבים המרכזית.
4. החרפה של מיאסטניה גראביס (מחלה הגורמת לחולשת שרירים).

למידע נוסף ראה סעיף 2 "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה".

תרופה זו עלולה לגרום לרגישות מיוחדת עם חשיפה לשמש (ראה בסעיף 2 "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה").

1) למה מיועדת התרופה?

מגאקסין מיועדת לטיפול בחולים מעל לגיל 18 ל:

- זיהומים בדרכי נשימה- הכוללים דלקת גת (סינוסיטיס) חידקית חריפה, החרפה של דלקת סימפונות (ברונכיטיס) כרונית. יש להשתמש במגאקסין לטיפול בזיהומים אלה רק במקרים שלא ניתן להשתמש בתרופות אחרות המיועדות לטיפול בהם או שהטיפול בהם לא צלח.
- מקרים לא חמורים של דלקת ריאות. יש להשתמש במגאקסין רק במקרים בהם לא ניתן להשתמש בתרופות אחרות המיועדות לטיפול בזיהום זה.
- זיהומי עור.

קבוצה תרופוטית: אנטיביוטיקה ממשפחת הפלואורוקווינולונים.

2) לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- חווית בעבר תגובה אלרגית חמורה לאנטיביוטיקה ממשפחת הפלואורוקווינולונים.
- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (לרשימת המרכיבים הלא פעילים, ראה סעיף 6 "מידע נוסף").

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

בעיות בגיד עלולות לקרות לאנשים בכל הגילאים המטופלים במגאקסין טבליות. תסמינים של בעיות בגידים עלולים לכלול:

- כאב, נפיחות, קרעים ודלקות בגידים ובכללם הגיד האחורי של הקרסול (אכילס), גידי הכתף, היד, או גידים אחרים.

- הסיכון שתפתח בעיות בגידים בזמן נטילת מגאקסין טבליות גבוה יותר במידה והנך:

- מעל גיל 60.
- מטופל בסטרואידים (קורטיקוסטרואידים).
- מושגת כליה, לב או ריאה.

בעיות בגידים עלולות להתרחש גם במטופלים הנוטלים מגאקסין טבליות ללא גורמי הסיכון הנ"ל.

- סיבות נוספות שעשויות להעלות את הסיכון לבעיות בגידים כוללות:

- פעילות גופנית או התעמלות.
- כשל כלייתי.
- בעיות בגידים בעבר, למשל באנשים החולים בדלקת מפרקים שגרנית (rheumatoid arthritis).

- יש להפסיק נטילת מגאקסין טבליות מיד ולפנות לרופא מיד עם הופעת הסימן הראשון לכאב בגיד, נפיחות או דלקת. הפסק לקחת מגאקסין טבליות עד שרופא שולל דלקת או קרע בגיד. הימנע מהתעמלות והפעלת האזור הפגוע. איזור הכאב והנפיחות הנפוץ ביותר הוא גיד אכילס מאחורי הקרסול. תופעות אלו יתכנו גם בגידים אחרים.

- התייעץ עם הרופא לגבי הסיכון שבקריעת גידים במהלך טיפול ממושך במגאקסין טבליות. ייתכן ותזדקק לאנטיביוטיקה שונה לטיפול בזיהום, שאינה פלואורוקווינולון.

- קרע בגיד עלול להתרחש בזמן נטילת מגאקסין טבליות ולאחר סיום נטילתו. קרעים עלולים להתרחש תוך שעות או ימים לאחר נטילת מגאקסין טבליות ואף התרחשו עד כמה חודשים לאחר שצרכנים סיימו את נטילת הפלואורוקווינולון.

- פנה מיד לקבלת עזרה רפואית במידה ומופיעים אחד מהסימנים או התסמינים הבאים המעידים על קרע בגיד:
 - הנך שומע או מרגיש בפקיעה באיזור הגיד.
 - חבורות המופיעות מיד לאחר פציעה באיזור הגיד.
 - אי יכולת להזיז את האיזור הפגוע או לשאת משקל.

- שינויים בתחושה ואפשרות לנזק עצבי (נירופתיה היקפית).
נזק לעצבים בזרועות, בידים, ברגליים או בכף הרגל עלול להתרחש במטופלים הנוטלים פלואורוקווינולונים, כולל מגאקסין טבליות.

יש להפסיק מיד את השימוש במגאקסין טבליות ולפנות מיד לרופא אם אתה סובל מאחד מהתסמינים הבאים בזרועות, בידים, ברגליים או בכף רגל, תסמינים המעידים על נירופתיה היקפית:

- כאב
- תחושת שריפה
- נימול
- חוסר תחושה
- חולשה

יש להפסיק את השימוש במגאקסין על מנת למנוע נזק עצבי קבוע.

- החמרה של מיאסטניה גראביס:
 - פלואורוקווינולונים כגון מגאקסין טבליות עלולים לגרום להחרפת תסמינים של מיאסטניה גראביס, ובכללם חולשת שרירים ובעיות נשימה. אם יש לך היסטוריה של מיאסטניה גראביס, דווח על כך לרופא לפני נטילת מגאקסין טבליות. יש לפנות לרופא מיד במידה ואתה חווה החרפה בחולשת השרירים או בעיות נשימה.
- השפעות על מערכת עצבים מרכזית:
 - ישנם דיווחים על פרכוסים במטופלים שנטלו אנטיביוטיקות ממשפחת הפלואורוקווינולונים ובכללן מגאקסין טבליות. אם יש לך היסטוריה של פרכוסים דווח על כך לרופא שלך לפני נטילת מגאקסין טבליות.
 - תופעות לוואי במערכת העצבים המרכזית עלולות להתרחש מיד לאחר נטילת המנה הראשונה של מגאקסין טבליות.
 - יש להפסיק את השימוש במגאקסין טבליות ולפנות מיד לרופא במידה והנך סובל מאחת מתופעות הלוואי הבאות, או אם יש לך שינויים אחרים במצב הרוח או בהתנהגות:
 - תחושת סחרחורת
 - פרכוסים
 - הנך שומע קולות, רואה דברים או חש בדברים שאינם שם בפועל (הזיות)
 - תחושת חוסר מנוחה
 - רעידות
 - תחושת חרדה או עצבנות
 - תחושת בלבול
 - דכאון
 - הפרעות בשינה
 - חש חשדן יותר (פרנויה)
 - מחשבות או מעשים אובדניים
 - סיוטי לילה
 - כאבי ראש שלא חולפים עם או ללא טשטוש ראייה

לפני הטיפול במגאקסין טבליות ספר לרופא אם:

- הנך סובל מבעיות בגידים. אין להשתמש במגאקסין טבליות במידה ויש לך היסטוריה של בעיות בגידים.
- הנך סובל ממחלה הגורמת לחולשת שרירים (מיאסטניה גראביס). אין להשתמש במגאקסין טבליות במידה ויש לך היסטוריה של מיאסטניה גראביס.
- הנך סובל מבעיות במערכת עצבים מרכזית (כגון אפילפסיה).
- הנך סובל מבעיות בעצבים. אין להשתמש במגאקסין טבליות במידה ויש לך היסטוריה של בעיות בעצבים הנקראת נירופתיה היקפית.
- אתה או משהו מבני משפחתך סובל מהפרעות בקצב הלב, במיוחד מצב הנקרא "הארכת מקטע QT".
- יש לך רמות נמוכות של אשלגן בדם (היפוקלמיה).
- הנך סובל מקצב לב נמוך (ברדיקרדיה).
- יש לך היסטוריה של פרכוסים.
- הנך סובל מבעיות בכליות.
- הנך סובל מדלקת מפרקים שגרונת (rheumatoid arthritis) או שסבלת בעבר מבעיות מפרקים כלשהן.
- את בהריון או מתכננת להיכנס להריון. לא ידוע האם תרופה זו מזיקה לעוברך.
- את מניקה או בכוונתך להניק. לא ידוע אם תרופה זו עוברת לחלב האם. עליך להגיע להחלטה משותפת ביחד עם הרופא האם להניק או ליטול מגאקסין טבליות.
- יש לך סוכרת או בעיות עם רמות סוכר נמוכות בדם (היפוגליקמיה).

חשיפה לשמש ומיטות שיזוף

השתדל להגביל את שהותך בשמש והימנע משימוש במנורות שיזוף ובמיטות שיזוף. מגאקסין טבליות עלול לגרום לרגישות של העור בזמן חשיפה לשמש ולאור ממנורות ומיטות שיזוף. אתה עלול לסבול מכוויות חמורות, משלפוחיות או מפליחיות בעור. במידה ואחד מהסימנים הללו מופיעים בזמן הטיפול במגאקסין טבליות, יש לפנות בהקדם לרופא. עליך להשתמש במסנן קרינה, לחבוש כובע וללבוש בגדים המכסים את עורך במידה והנך צריך להחשף לשמש.

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:

- נוגדי דלקת שאינם סטרואידים (NSAIDs). תרופות רבות להקלה על כאב משתייכות לקבוצה זו. שימוש בתרופות אלו בזמן הטיפול במגאקסין טבליות או בפלואורוקווינולונים אחרים עלול להגדיל את הסיכון לתופעות במערכת העצבים המרכזית ולפרוסים. ראה סעיף 4 "תופעות לוואי".
 - מדללי דם (כגון וארפרין (קומדין)).
 - תרופות המשפיעות על קצב הלב וסדירות פעימות הלב (אנטיאריטמיות) (ראה סעיף 4 "תופעות לוואי").
 - תרופות אנטיפסיכוטיות.
 - תרופות נגד דיכאון מקבוצת הטרזיקלים.
 - תרופות לטיפול בסוכרת הנלקחות דרך הפה או אינסולין.
 - אריתומיצין.
 - משתנים.
 - סטרואידים: קורטיקוסטרואידים הנלקחים דרך הפה או בזריקה עלולים להעלות את הסיכון לפגיעה בגידים. ראה סעיף 4 "תופעות לוואי".
 - תרופות מסוימות עלולות לפגוע ביעילות התרופה. יש ליטול מגאקסין טבליות 4 שעות לפני או 8 שעות אחרי נטילת התכשירים הבאים:
 - נוגדי צרבות, מולטי ויטמינים או תכשירים אחרים המכילים מגנזיום, אלומיניום, ברזל או אבץ
 - סוכראלפאט
 - דיידאנוזין (תמיסה או תרחיף הניטלים דרך הפה)
- שאל את הרופא שלך במידה ואינך בטוח אם אחת מהתרופות שהינך נוטל מוזכרת ברשימה מעלה. דע אלו תרופות אתה נוטל. שמור רשימת התרופות שלך והצג אותה לרופא או לרוקח בעת קבלת תרופה חדשה.

שימוש בתרופה ומזון

ניתן ליטול מגאקסין טבליות עם או ללא מזון. יש לשנות הרבה נוזלים בזמן הטיפול במגאקסין טבליות.

הריון והנקה

עליך להתייעץ עם הרופא המטפל במידה והנך בהריון או מתכננת הריון. לא ידוע אם מגאקסין טבליות פוגע בעובר. עליך להתייעץ עם הרופא המטפל במידה והנך מניקה או מתכננת להניק. לא ידוע אם מגאקסין טבליות עובר לחלב האם. עליך לקבל החלטה משותפת ביחד עם הרופא האם להניק או ליטול מגאקסין טבליות.

נהיגה ושימוש במכונות

מגאקסין טבליות עלול לגרום לסחרחורת. אין לנהוג, להפעיל מכונות או לעסוק בפעילויות אחרות המצריכות ערנות או קואורדינציה כל עוד אינך יודע בוודאות כיצד מגאקסין טבליות משפיע עליך.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

כל טבליה מכילה 68 מ"ג לקטוז. במידה ונאמר לך שיש לך אי-סבילות לסוכרים מסוימים, יש לשוחח על כך עם הרופא לפני נטילת התרופה.

3) כיצד תשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח. המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא טבליה אחת ליום. עליך ליטול את התרופה בערך באותה שעה בכל יום.

אין לעבור על המנה המומלצת.

צורת הנטילה

אין מידע לגבי כתישה/חציה/לעיסה.

עליך לבלוע את הטבליה עם או ללא מזון. עליך להקפיד על שתיית מים מספקת במהלך הטיפול במגאקסין טבליות.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה בזמן הדרוש יש ליטול מנה מיד כשנזכרת. אל תקח יותר ממנה אחת של מגאקסין טבליות ביום אחד.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא.

אין לדלג על מנה או להפסיק את הטיפול במגאקסין טבליות גם במידה ואתה מרגיש שיפור במצב בריאותך. עליך לסיים את הטיפול כפי שנרשם עבורך, אלא אם:

- הנך מרגיש בתופעות לוואי בגידים, ראה בסעיף "מידע חיוני על התרופה" בתחילת העלון ובסעיף 4 "תופעות לוואי".

הנך מפתח בעיות עצביות, ראה בסעיף "מידע חיוני על התרופה" בתחילת העלון ובסעיף 2 "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה".

הנך מרגיש בתופעת לוואי במערכת העצבים המרכזית, ראה בסעיף "מידע חיוני על התרופה" בתחילת העלון ובסעיף 2 "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה".

- הנך מפתח תגובה אלרגית חמורה, ראה סעיף 4 "תופעות לוואי".
- איש צוות רפואי מורה לך להפסיק.

הוראות אלו יסייעו בחיסול החיידקים ובהורדת הסיכון שהחיידקים יפתחו עמידות למגאקסין טבליות. במידה ומתפתחת עמידות, מגאקסין טבליות ואנטיביוטיקות אחרות עלולות לאבד מעילותן בעתיד.

- אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויות והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4) תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש במגאקסין עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

מגאקסין טבליות עלול לגרום לתופעות לוואי העלולות להיות חמורות ואף מסכנות חיים.

1. קריעה או התנפחות של הגיד (דלקת בגיד). ראה סעיף 2 "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה".

2. שינויים בתחושה ונזק עצבי (נירופתיה פריפריאלית). ראה סעיף 2 "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה".

3. השפעות על מערכת העצבים המרכזית ראה סעיף 2 "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה".

4. החרפה של מיאסתניה גראביס (מחלה הגורמת לחולשת שרירים). ראה סעיף 2 "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה".

תופעות לוואי חמורות נוספות:

- תגובות רגישות (אלרגיה) חמורות
תגובות אלרגיות חמורות עלולות להופיע גם לאחר נטילת מנה אחת בלבד של פלואורוקווינולונים כולל מגאקסין טבליות.
יש להפסיק את השימוש במגאקסין טבליות ולפנות מיד לרופא אם הנך סובל מאחד מהתסמינים הבאים המעידים על תגובה אלרגית חמורה:
 - חרלת (אורטיקריה)
 - קושי לנשום או לבלוע
 - התנפחות של השפתיים, הלשון או הפנים
 - הצרות של הגרון, צרידות
 - דפיקות לב מהירות
 - עילפון
 - הצהבה של לובן העין או העור או אם השתן שלך כהה. תסמינים אלו עלולים להעיד על תגובה חמורה למגאקסין טבליות (בעיות בכבד). יש להפסיק נטילת מגאקסין טבליות מיד ולפנות לרופא עם הופעתם.

- פריחה בעור
פריחה בעור עלולה להתפתח במטופלים הנוטלים מגאקסין טבליות, גם לאחר מנה אחת בלבד.
יש להפסיק את השימוש בתרופה וליצור קשר עם הרופא שלך עם הופעת הסימן הראשון של פריחה בעור. פריחה בעור עלולה להיות סימן לתגובה חמורה יותר למגאקסין טבליות.
 - שינויים חמורים בקצב הלב (הארכת מקטע QT ו-torsades de pointes)
ספר לרופא בהקדם האפשרי אם אתה חווה שינויים בקצב הלב (קצב לב מהיר או לא סדיר), או אם הנך מתעלף.
מגאקסין טבליות עלול לגרום לבעיה לב נדירה הידועה הנקראת "הארכת מקטע QT". תופעה זו עלולה לגרום לקצב לב לא סדיר ועלולה להיות מסוכנת מאוד. הסיכויים לכך גבוהים יותר בקרב אנשים מהקבוצות הבאות:
– קשישים
– בעלי היסטוריה משפחתית של הארכת מקטע QT
– מטופלים עם רמות נמוכות של אשלגן בדם (היפוקלמיה)
– מטופלים הנוטלים תרופות מסוימות לשליטה בקצב הלב (אנטיאריטמיות).
 - זיהום מעי
זיהום במעי עלול להתרחש עם מרבית האנטיביוטיקות, כולל מגאקסין טבליות.
יש לפנות לרופא מיד אם אתה סובל משלשול מיימי, שלשול שלא חולף, או צואה דמית. ייתכן ותסבול מכאבי בטן ומחום. זיהום המעי עלול להופיע גם חודשיים ויותר לאחר שסיימת ליטול את האנטיביוטיקה.
 - הפרעות ברמת הסוכר בדם
מטופלים הנוטלים מגאקסין טבליות ואנטיביוטיקות נוספות ממשפחת הפלואורוקווינולונים בו זמנית עם תרופות לטיפול בסוכרת הנלקחות דרך הפה או עם אינסולין, יכולים לחוות רמת סוכר נמוכה בדם (היפוגליקמיה) או רמת סוכר גבוהה בדם (היפרגליקמיה). פעל לפי הנחיות הרופא שלך לגבי תדירות בדיקות של רמת הסוכר בדמך. אם הינך סובל מסוכרת וחווה ירידה ברמת הסוכר במהלך הטיפול עם מגאקסין טבליות, הפסק את נטילת מגאקסין טבליות ופנה לרופא מיד. ייתכן ויהיה צורך לשנות לך את סוג האנטיביוטיקה.
 - רגישות לאור
ראה בסעיף 2 "חשיפה לשמש ומיטות שיזוף".
- תופעות לוואי נוספות:
להלן פירוט תופעות לוואי לפי שכיחויות
תופעות לוואי שכיחות – תופעות המופיעות ב 10-1 משתמשים מתוך 100:
- אנמיה
 - בחילה והקאה, שלשול, עצירות, כאב בטן והפרעות עיכול
 - חום גבוה
 - עלייה ברמות אלנין אמינוטראנספראז
 - היפוקלמיה (רמות אשלגן נמוכות בדם)
 - כאב ראש וסחרחורת
 - נדודי שינה
- תופעות לוואי שאינן שכיחות – תופעות המופיעות ב 10-1 משתמשים מתוך 1000:
- הפרעות במערכת הדם
 - פרפור עליות, דפיקות לב (פלפיטציות), קצב לב מהיר, אי ספיקת לב, תעוקת חזה, דום לב, קצב לב איטי
 - ורטיגו וזמזום באוזניים (טיניטוס)
 - טשטוש ראייה
 - יובש בפה, אי נוחות בבטן, גזים, דלקת בקיבה והחזר ושטי (רפלוקס)
 - עייפות, כאב בחזה, חולשה (אסטניה), בצקת, כאב, הרגשת חולי כללית, צמרמורות, אי נוחות בחזה וכאב בפנים
 - הפרעות בתפקוד הכבד
 - זיהום בנרתיק, זיהום פטרייתי (כולל קנדידה), דלקת הקיבה והמעי
 - הפרעות בבדיקות דם
 - הפרעות בא.ק.ג.
 - רמות סוכר גבוהות בדם (היפרגליקמיה), ירידה חולנית במשקל (אנורקסיה), עלייה ברמות השומנים בדם, ירידה בתאבון, התייבשות

- כאבי גב, כאב בגפיים, כאב המשפיע על שרירים, רצועות, גידים ועצמות, כאבים במפרקים, עוויתות שרירים
- הפרעה בחוש הטעם, ישנוניות, רעד, חוסר אנרגיה, הפרעה בתחושה, ירידה בתחושה, עלפון
- חדרה, בלבול, חוסר שקט, דכאון, עצבנות, חוסר מנוחה, הזיות, חוסר התמצאות במרחב
- כשל כלייתי, כאב וצריבה במתן שתן
- גרד בנרתיק
- פריחה, גרד, אדמומיות, סרפדת (אורטיקריה), דלקת עור אלרגית, הזעות לילה, הזעת יתר
- קשיי נשימה, אסתמה, צפצופים, התכווצויות בדרכי הנשימה
- לחץ דם גבוה, לחץ דם נמוך, דלקת בכלי הדם

שינויים בבדיקות דם:

בנוסף דווחו שינויים בבדיקות דם כגון: עלייה בספירת תאי דם לבנים, עלייה ברמת הנויטרופילים בדם, ירידה בהמוגלובין, ירידה בתאי דם לפנים, ירידה בנויטרופילים, ירידה באאזנופילים, ירידה ברמות גלוקוז בדם. לא ניתן לקבוע אם שינויים אלה נגרמו על ידי נטילת התרופה או על ידי המחלה הזיהומית עצמה.

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה

- ירידה חדה ברמות תאי דם לבנים
- הפרעות קצב לב (כולל דום לב)
- פגיעה בשמיעה כולל חרשות (לרוב הפיכה)
- עיוורון (לרוב זמני)
- דלקת כבד, כשל כבדי (כולל כשל קטלני), צהבת, נמק כבדי
- תגובה אנפילקטית, הלם אנפילקטי, אנגיואדמה
- קרע בגיד
- פגיעה בקואורדינציה ובתנועה
- החמרה במיאסטתיה גראביס
- חולשת שרירים
- נזירופתיה היקפית (עלולה להיות קבועה), פגיעה עצבית
- תגובה פסיכוטית (כולל מחשבות והתנהגויות אובדנית נדירות מאוד)
- דלקת בכליה
- דלקת ריאות ממקור אלרגי
- רגישות יתר לאור
- תסמונת סטיבנס-ג'ונסון
- נמק אפידרמי רעלני (Toxic epidermal necrolysis)

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

צור קשר עם הרופא במידה ואתה חש כי מצב בריאותך לא השתפר במהלך הטיפול עם מגאקסין טבליות.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" (המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, www.health.gov.il, שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות) או ע"י כניסה לקישור:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

5) איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על-גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.
- אחסן בטמפרטורה הנמוכה מ- 25°C ובאריזה המקורית על מנת להגן מפני לחות.

6) מידע נוסף

- נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:
Cellulose microcrystalline, lactose monohydrate, croscarmellose sodium, magnesium stearate, ferric oxide red, hypromellose 15 cP, macrogol 4000, titanium dioxide.
- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה
מגאקסין טבליות הינה טבליה מצופה, מוארכת, בצבע אדום עמום המסומנת בכיתוב BAYER בצד אחד וב – M400 בצידה השני.
הטבליות מגיעות במגשיות (בליסטרים) באריזות של 5, 7 ו-10 טבליות.
ייתכן ולא כל גדלי האריזות משווקים.
- בעל הרישום וכתובתו: באייר ישראל בע"מ, רח' החרש 36, הוד השרון 45240.
- שם היצרן וכתובתו: באיירפרמה א.ג., לוורקוזן, גרמניה.
- עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: דצמבר 2016.
- מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 117 77 29884 01/02
- לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.