

כרטיס מידע בטיחותי למטופל בפרדקסה (דביגטרן אטקסילאט)

אנא שמור כרטיס זה
בהישג יד, בכל זמן נתון

אנא הצג כרטיס זה
לכל רופא/רופא שיניים
לפני קבלת טיפול רפואי



מידע למטופל בפרדקסה (דביגטרן אטקסילאט)

- עליך לעשות שימוש בפרדקסה על-פי הוראות הרופא המטפל שלך
- למידע מלא על התרופה יש לעיין בעלון לצרכן המצורף לתכשיר

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות הטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות: www.health.gov.il

או ע"י כניסה לקישור:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

כמו כן, ניתן לדווח על תופעות לוואי לחברת בורינגר אינגלהיים ישראל:

בורינגר אינגלהיים ישראל בע"מ

מדינת היהודים 89, הרצליה פיתוח, ת.ד. 4124, 4676672
טלפון: 09-9730500, פקס: 09-9730549

DOR-16570PC-0915-06

מידע חירום

שם המטופל:

תאריך לידה:

סוג דם:

במקרה של פנייה לקבלת טיפול רפואי כולל טיפול חירום יש ליידע את הצוות הרפואי על נטילת פרדקסה. במקרים של דימום מסכן חיים או דימום בלתי נשלט, כאשר נדרש היפוך מהיר של פעולתה נוגדת הקרישה של פרדקסה, קיים תכשיר ייחודי Praxbind הסותר את פעולתה.

איש קשר

לשעת חירום

שם

מספר נייד

הרופא

המטפל

שם

מספר נייד

חתימת הרופא המטפל

הנחיות חשובות למטופל

- יש ליטול את התרופה אך ורק לפי ההוראות שרשם לך הרופא המטפל (לדוגמא, פעמיים ביום).
- יש לבלוע את הכמוסה בשלמותה, עם כוס מלאה של מים. אין ללעוס או לפתוח את הכמוסות.
- אין לדלג על המנה. אי נטילת התרופה, משמעה העדר הגנה מפני שבץ מוחי ו/או קריש דם.
- אין להפסיק את נטילת התרופה ללא התייעצות עם הרופא המטפל.
- יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני נטילת תרופות או תוספי מזון הנמכרים ללא מרשם.
- יש לוודא כי הרופא מודע לכל התרופות הנוספות שהינך נוטל.
- אם הינך מקבל פרדקסה למניעת פקקת ורידים תסחיפית לאחר ניתוחים אורטופדיים, במידה ושכחת ליטול את התרופה, יש ליטול את המנה הבאה של פרדקסה למחרת היום בשעה הרגילה.
- אם הינך מקבל פרדקסה למניעת שבץ או כטיפול לפקקת ורידים עמוקה (DVT) ותסחיף ריאתי (PE) ומניעת הישנותם, במידה ושכחת ליטול את התרופה, יש ליטול את המנה מיד כשנזכרת, אך רק במידה ונשארו יותר מ- 6 שעות עד המנה הבאה.
- אל תיקח מנה כפולה כדי לפצות על המנה שנשכחה.
- בכל מקרה של ספק יש להתייעץ עם הרופא או הרוקח.

- אם הינך מקבל נוגדי דלקת שאינם סטרואידליים, לדוגמא נורופן או אדוויל, יש להוועץ ברופא המטפל מכיוון שהם עלולים להעלות באופן משמעותי את הסיכון שלך לדמם.
- שים לב לגורמי סיכון לדמם הבאים: גיל מעל 75 שנים, דימום משמעותי בעבר, הפרעה כלייתית, הפרעה כבדית, דלקת בוושט או קיבה, נטילת תרופות המשפיעות על קרישת דם כגון אספירין ונוגדי קרישה אחרים.
- בכל מקרה של הופעת סימני דמם (חולשה יוצאת דופן, עייפות, חיוורון, סחרחורת, כאבי ראש או נפיחות לא מוסברת, אנמיה, הקאה דמית, תחושת עילפון, דימום מהאף, שטפי דם תת עוריים, דם בשתן או בצואה, צואה שחורה וכו') יש לפנות באופן מיידי לרופא המטפל.
- במקרה של דימום חריג או דימום שאינו מפסיק באופן ספונטני, יש ליידע מיד את הרופא (יש לעיין בעלון לצרכן לפירוט סימני דימום מפורט).
- אם נפלת או נפצעת, במיוחד אם נפגעת בראש, יש לגשת מיד לקבלת עזרה רפואית.
- אם הינך עומד לעבור ניתוח, טיפול שיניים או פרוצדורה פולשנית, יש ליידע את הרופא המנתח (או רופא שיניים) לפני ביצוע הפרוצדורה, שהינך נוטל פרדקסה.
- הנוסח הינו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הכרטיס מיועד לנשים וגברים כאחד.

בקש מהרופא המטפל שלך למלא את הפרטים הבאים:

שם המטופל:

תאריך לידה:

מטרת הטיפול (סמן בריבוע הנכון):

- ☐ מניעת שבץ
- ☐ מניעת פקקת ורידים תסחיפית לאחר ניתוחים אורטופדיים
- ☐ פקקת ורידים עמוקה (DVT) ותסחיף ריאתי (PE) ומניעת הישנותם

מינון ומועדי נטילה:

(לדוגמא 150 מ"ג פעמיים ביום, ב-8 בבוקר ו-8 בערב)

תפקוד כלייתי בעת תחילת הטיפול CrCl ml/min

פרדקסה אינה מותוות לטיפול בחולים בעלי ערכי CrCl מתחת ל-30 ml/min. במצבים רפואים מסוימים יש צורך בהתאמת מינון (לפירוט מלא ראה עלון לרופא).

מועד תחילת הטיפול

שם הרופא המטפל

מספר טלפון של הרופא המטפל