

זובירקס[™] טבליות 200 מ"ג

זובירקס[™] טבליות 400 מ"ג

זובירקס[™] טבליות מסיסות 800 מ"ג

זובירקס טבליות 200 מ"ג - כל טבליה מכילה 200 מ"ג אציקלוביר. (aciclovir 200 mg)
זובירקס טבליות 400 מ"ג - כל טבליה מכילה 400 מ"ג אציקלוביר. (aciclovir 400 mg)
זובירקס טבליות מסיסות 800 מ"ג - כל טבליה מכילה 800 מ"ג אציקלוביר. (aciclovir 800 mg)

רשימת הרכיבים הנוספים מפורטת בסעיף 6.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

תרופה זו אינה מיועדת לילדים ותינוקות מתחת לגיל שנה לטיפול באבעבועות רוח.

1. למה מיועדת התרופה?

זובירקס טבליות (נקראת 'זובירקס' בעלון זה) מכילה תרופה הנקראת אציקלוביר. היא פועלת על ידי קטילה או עצירת הגדילה של נגיפים.

זובירקס טבליות יכולה לשמש ל:

- טיפול בפצעי קור ובהרפס של אברי המין (הרפס סימפלקס) ומניעת חזרתם.
- טיפול בשלבקת חוגרת.
- טיפול באבעבועות רוח בקבוצות הבאות:
 1. מבוגרים ומתבגרים מעל גיל 13 שנים (אינו מיועד לשימוש לנשים בהריון).
 2. ילדים מעל גיל 12 חודשים הסובלים ממחלות עור או מחלות ריאה כרוניות או המטופלים טיפול ממושך בסליצילטים.
 3. ילדים המטופלים בסטרואידים לטווח קצר או לסירוגין או בשאיפה (מומלץ להפסיק זמנית הטיפול בסטרואידים).

קבוצה תרפויטית

אנטיוויראלי.

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לאציקלוביר או ואלאציקלוביר או לכל אחד מהרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורטים בסעיף 6).
- אל תיקח זובירקס אם זה חל עליך. אם אינך בטוח, פנה לרוקח או לרופא שלך לפני נטילת זובירקס.

אזהרות מיוחדות לנוגעות לשימוש בתרופה

פנה אל הרוקח או הרופא שלך לפני שאתה לוקח זובירקס אם:

- יש לך בעיות כליות
 - אתה מעל גיל 65 שנים.
- אם אינך בטוח אם אלה חלים עליך, דבר עם הרוקח או הרופא שלך לפני נטילת זובירקס.

חשוב שתשתה הרבה מים בזמן נטילת זובירקס.

אם עברו יותר מ-24 שעות מהופעת השלפוחית הראשונה, התרופה אינה מומלצת.

תרופות אחרות וזובירקס
אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

במיוחד אם אתה לוקח:

- פרובנציד, משמשת לטיפול בשיגדון
- סימטידין, משמשת לטיפול בכיבי קיבה
- מיקופנוולט מופטיל, משמשת למנוע מגופך לדחות איברים מושתלים.

הריון והנקה

אם הינך בהריון או מניקה יש להיוועץ ברופא לפני השימוש בתרופה.

מידע חשוב על חלק מהרכיבים של התרופה

זובירקס טבליות 200 מ"ג מכילה לקטוז. אם נאמר לך על ידי הרופא שלך שיש לך אי סבילות לסוכרים מסוימים, פנה לרופא שלך לפני נטילת תכשיר רפואי זה.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

נטילת תרופה זו

- יש לקחת תרופה זו דרך הפה.
 - זובירקס טבליות 200 מ"ג ו- 400 מ"ג – בלע את הטבליה בשלמותה עם מעט מים.
 - זובירקס טבליות מסיסות 800 מ"ג - יש להמיס את הטבליה בכוס מים ולערבב לפני השתיה. אם אתה מעדיף, ניתן לבלוע את הטבליה בשלמותה עם מעט מים.
 - עליך לוודא שאתה **שותה הרבה נוזלים כמו מים** במשך הטיפול בזובירקס.
 - יש להתחיל לקחת זובירקס בהקדם האפשרי.
- המנה שאתה צריך לקחת תהיה תלויה בסיבה שלשמה זובירקס ניתנת לך. הרופא שלך ישוחח איתך על זה.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

יתכן שהרופא שלך ישנה את מנת הזובירקס אם:

- היא מיועדת לילד
 - אתה מעל גיל 65 שנים
 - יש לך בעיות כליות. אם יש לך בעיות כליות, חשוב שתשתה הרבה מים בזמן שאתה מטופל בזובירקס.
- דבר עם הרופא שלך לפני נטילת זובירקס אם אחד מאלה חל עליך.

אין לעבור על המנה המומלצת

אם לקחת בטעות מינון גבוה יותר

זובירקס אינה מזיקה בדרך כלל, אלא אם לקחת יותר מדי במשך מספר ימים. פנה לרוקח או לרופא שלך אם לקחת יותר מדי זובירקס. הבא את אריזת התרופה איתך.

אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת לקחת את התרופה

- אם שכחת לקחת זובירקס, קח ברגע שאתה זכר. אולם, אם זה קרוב למועד המנה הבאה שלך, דלג על המנה שהוחמצה.
- אין לקחת מנה כפולה כדי לפצות על מנה שנשכחה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אין לקחת תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה לוקח תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בזובירקס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

- תגובות אלרגיות** (מופיעות בפחות מ - 1 מכל 1,000 אנשים)
אם יש לך תגובה אלרגית, **הפסק לקחת זובירקס ופנה מיד לרופא**. הסימנים יכולים לכלול:
- פריחה, גרד או חרלת (גבשושיות מגרדות) על העור שלך
 - נפיחות של הפנים, השפתיים, הלשון או חלקים אחרים של הגוף שלך
 - קוצר נשימה, צפצופים או קשיי נשימה
 - חום לא מוסבר ותחושת עלפון, במיוחד כאשר נעמדים.

תופעות לוואי נוספות

תופעות לוואי שכיחות (מופיעות בפחות מ - 1 מכל 10 אנשים)

- כאב ראש
- תחושת סחרחורת
- בחילה או הקאה
- שלשול
- כאבי בטן
- פריחה
- תגובה עורית לאחר חשיפה לאור (רגישות יתר לאור)
- גרד
- תחושת עייפות
- חום.

תופעות לוואי שאינן שכיחות (מופיעות בפחות מ - 1 מכל 100 אנשים)

- פריחה מגרדת דמוית חרלת
- נשירת שיער.

תופעות לוואי נדירות (מופיעות בפחות מ - 1 מכל 1,000 אנשים)

- קשיי נשימה
- השפעות על בדיקות דם ושתן מסוימות
- נפיחות של הפנים, השפתיים, הפה, הלשון או הגרון שלך.

תופעות לוואי נדירות מאוד (מופיעות בפחות מ - 1 מכל 10,000 אנשים)

- דימומים מהאף וחבורות ביתר קלות
- תחושת חולשה
- תחושת אי שקט או בלבול
- רעידות
- הזיות (ראיה או שמיעה של דברים שאינם קיימים)
- פרכוסים
- תחושת נמנום או ישנוניות לא רגילה
- חוסר יציבות בעת הליכה וחוסר קואורדינציה
- קושי בדיבור
- חוסר יכולת לחשוב או לשפוט בבהירות
- אובדן הכרה (תרדמת)
- שיתוק של חלק או של כל גופך
- הפרעות בהתנהגות, בדיבור ובתנועות העין
- קשיון בצוואר ורגישות לאור
- דלקת בכבד (הפטיטיס)
- הצהבה של עורך והחלק הלבן של עיניך (צהבת)
- בעיות כליה בהן אתה נותן מעט שתן או בכלל לא
- כאבים בגבך התחתון, באזור הגב שבו ממוקמת הכליה שלך או מעל אגן הירכיים שלך (כאב כלייתי).

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ לשדה ראייתם והישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי הקרטון. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- אין לאחסן מעל 30°C.

6. מידע נוסף

- נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם –
זובירקס טבליות 200 מ"ג ו- 400 מ"ג

Lactose monohydrate (only 200 mg tablets), microcrystalline cellulose, sodium starch glycollate, povidone K30, magnesium stearate.

זובירקס טבליות מסיסות 800 מ"ג

Microcrystalline cellulose, aluminium magnesium silicate, sodium starch glycollate, povidone K30, magnesium stearate, hypromellose, titanium dioxide (E171), polyethylene glycol 400, polyethylene glycol 8000.

- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה –
זובירקס טבליות 200 מ"ג מסופקת לך באריזת קרטון המכילה 25 טבליות באריזות בליסטר. הטבליות לבנות, עגולות, קמורות, מסומנות ב"GXCL3" בצדן האחד וחלקות בצדן השני.
- זובירקס טבליות 400 מ"ג מסופקת לך באריזת קרטון המכילה 56, 70 טבליות באריזות בליסטר. הטבליות לבנות, בצורת מגן, מסומנות ב"GXCM1" בצדן האחד וחלקות בצדן השני.
- זובירקס טבליות מסיסות 800 מ"ג מסופקת לך באריזת קרטון המכילה 35 טבליות באריזות בליסטר. הטבליות לבנות מצופות פילם אובליות וקמורות, מסומנות ב"GXCG1" בצדן האחד וחלקות בצדן השני.
- יתכן ולא כל גדלי האריזות ישווקו.
- בעל הרישום: גלקסוסמיתקליין (ישראל) בע"מ, רח' בזל 25, פתח תקוה.
- היצרן: גלקסו וולקאם S.A., בורגוס, ספרד.
- עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: ספטמבר 2014.
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
זובירקס טבליות 200 מ"ג: 126-41-30640
זובירקס טבליות 400 מ"ג: 126-40-30639
זובירקס טבליות מסיסות 800 מ"ג: 126-42-30641
- לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

Zov Tab PT v2