

<div></div>
<p>עלון לצרכן לפי תקנות הרוקמים (תכשירים) התשמ"ו – 1986</p> <p>התרופה מושקעת על פי מרשם רופא בלבד</p>
<p>רביף® 22 מק"ג</p> <p>רביף® 44 מק"ג</p> <p>תמיסה להזרקה תת-עורית</p>
<p>אינטרפרון ביתא-1a 1a- (interferon beta-1a)</p>
<p>מזרק מוכן להזרקה</p> <p>מחסנית להכנסה למזרק</p> <p>החומר הפעיל:</p>

אינטרפרון ביתא-1a 1a- (interferon beta-1a)

כל מזרק מוכן להזרקה של **רביף® 22 מק"ג** כולל מחס, מכיל: **22** מיקרוגרם (6 מיליון יחידות בינלאומיות [IU]) אינטרפרון ביתא-1a -0.5 מ"ל.

התכשיר מכיל 2.5 מ"ג בנייל אלקוחול.

כל מזרק מוכן להזרקה של **רביף® 44 מק"ג** כולל מחס, מכיל: **44** מיקרוגרם (12 מיליון יחידות בינלאומיות [IU]) אינטרפרון ביתא-1a -0.5 מ"ל.

התכשיר מכיל 2.5 מ"ג בנייל אלקוחול.

כל מחסנית של **רביף® 22 מק"ג** המוכנסת למזרק מתאים, מכילה:

66 מיקרוגרם (18 מיליון יחידות בינלאומיות [IU]) אינטרפרון ביתא-1a -1.5 מ"ל.

כל מחסנית של **רביף® 44 מק"ג** המוכנסת למזרק מתאים, מכילה:

132 מיקרוגרם (36 מיליון יחידות בינלאומיות [IU]) אינטרפרון ביתא-1a -3.5 מ"ל.

התכשיר מכיל 7.5 מ"ג בנייל אלקוחול.

חומרים בלתי פעילים: ראה סעיף 6.

קריא בעיון את העלון עד סופו כטרם תשתמש בתרופה.
עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה.

אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקם.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתו, אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.
על־ך להשתמש בתרופה בצורה נכונה.
• היוועץ ברוקם אם הך זקוק למידע נוסף.
על־ך לפנות אל הרופא באם סימני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים.
• אם אתה חש בתחושת לוווי כלשהן, פנה לרופא שלך. זה כולל כל תופעת לוווי אפשרית שאינה כלולה בעלון זה.
ראה סעיף 4.

התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל שנתיים. מתחת לגיל זה יש לפנות לרופא.

בעלון זה:

- מיה התרופה רביף ולמה היא מיועדת?
- כפי שישמש בתרופה רביף
- לפני שתשתמש בתרופה רביף?
- תופעות לוווי אפשריות
- איך לאחסן את התרופה רביף?
- מה מכילה התרופה רביף ומידע נוסף

- התרופה רביף ולמה היא מיועדת?**

רביף (אינטרפרון ביתא-1a) משתייך לקבוצת תכשירים הידועים כאינטרפרונים. אלו הם חומרים בטבעיים, שתפקידם להעביר מידע בין התאים.

האינטרפרונים מיוצרים על ידי הגוף ויש להם תפקיד מרכזי במערכת החיסון, הם פועלים על יתר מגננו של האדם בור במלאו ומסייעים בצמצום הנזק של מערכת העצבים המרכזית הכושרת לטרשת נפוצה.

רביף הינו אינטרפרון - חלבון מסוחר במיוחד ומסיס שמויצר בהנדסה גנטית, הוא דומה לאינטרפרון ביתא הטבעי שמויצר בגוף האדם.
רביף משמש כטיפול בטרשת נפוצה, מקטין את חדירות התקפים ועוצמולם ומאט את התקדמות המחלה.

רביף 44 מק"ג בלבד מאושר גם לשימוש במטופלים אשר חוו אירוע קליני בודד אשר הינו בסיסי ראשוני של טרשת נפוצה.

קבוצה תרופוית (טיפולית): מגרי מערכת החיסון - אינטרפרונים.

- לפני השימוש בתרופה רביף**

לאין להשתמש ברביף אם:

- הן גריש (אלרגי) לחומר הפעיל אינטרפרון ביתא טבעי או רקומבינטי או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6)
- הן בהריון (ראי סעיף "הריון והנקה")
- הן מצוי בדיכאון חריף

אזהרות ואמצעי זהירות הנוגעים לשימוש בתרופה

שוחם עם הרופא של, רוקם או אחות לפני השימוש ברביף.

- יש להשתמש ברביף רק בתחת השטחן רופא.
- לפני השימוש יש לקרוא בעיון את העלון ולהנהל על פי הוראות השימוש בעלון זה, זאת בכדי לצמצם את הסיכון לנזק באזור ההזרקה (פגיעה בעור ברוקמה), כפי שזוהו במטופלים שסופלו ברביף. אם נזק במבחן בבעור יש לגבות מקומית, יש לפנות לרופא.
- לפני השימוש ברביף, על־ך לדווח לרופא שלך או לרוקם אם הך אלרגי (בעל גרישות יתר) לכל תרופה שהיא.
- במידה ובמהלך הטיפול הופיעים סימנים של טרומבוציטופניה, ההפתחות של יתר לחץ דם חדש, חום, סימפטומים של מערכת העצבים המרכזית (כגון: בלבול או שיתוק) פגיעה בתפקוד הכליתי או ממצאים מעבדיים כגון: ספירת טסיות מופחתת, עלייה ב-LDH, יש לבצע בדיקות נוספות של ממות הסטיות LDH בסיום ובדיקות התפקוד הכליתי (כל הסימנים הללו יכולים להיות הצגה קרישית עד בכלי דם טסנים במהלך הטיפול אשר עלולים להשפיע על הליתי שלך).
על־יכול לקרות מספר דוושנים עד מספר שנים לאחר תחילת השימוש ברביף. במידה ואחד מפתח סימנים של בצקות, חלבון בשתן (פרוסטאטיה) ובעיות בתפקוד הכליתי, יש לדווח לרופא - ביידוד אם הך נמצא בקבוצת נזק גבוה להתפתחות של מחלת כלית ייתכן ואלו הם סימנים שידורום נפרוטי ולהפרעות בתפקוד הכלייתי).

- לפני הטיפול ברביף על־ך לדווח לרופא אם הך סובל ממחלות במח העצם, הכליה, הכבד, חלב, בלוטת התריס (התירואיד), אם סבל מדיכאון או מרעיונות אובדינים, אם יש לך רקע של התקפים אפילפטיים, אם הך נטל תרופות לאפילפסיה (ביידוד אם האפילפסיה לא מאוזנת), או אם הך סובל ממחלת לב (אנגינה, כשל לבבי או הפרעות צלב) כל זאת בכדי שהרופא ידאג לעקוב ולנטר את הטיפול כך או בהתמרה של מצבים אלו.

תרופות אחרות ורביף

על־ך לדווח לרופא שלך או לרוקם אם הך משתמש, השתמשת לאחרנה או עשוי להשתמש בתרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה.
ביידוד על־ך לדווח לרופא אם אתה משתמש בתרופות נדג דיקאון וגדג אפילפסיה.

הריון, הנקה ופוריות

אם את בהריון או מניקה, חושבת שיייתכן ואת בהריון או מתכננת להכנס להריון, שאלי את הרופא או הרוקם לפני נטילת התרופה.

אין להתחיל את השימוש בתרופה אם הך בהריון.
על נשים בגיל הפוריות להשתמש באמצעים למעטת הריון בעת השימוש ברביף. אם בכל זאת נכנסת להריון או שהך מתכננת הריון במהלך השימוש ברביף, על־ך לדווח ולהיוועץ ברופא!

לפני השימוש בתרופה, יש לדווח לרופא אם הך מניקה.
רביף אינו מומלץ לשימוש במהלך ההנקה.

המידע הקיים אודות השפעת רביף בהריון מוגבל. המידע הקיים מראה כי עלול להיות סיכון מוגבר להפלה ספונטנית. לכן אין להתחיל טיפול עם רביף בהריון.

ההיגיה ושימוש במחנות

השימוש בתרופה או מצב מחלתך עלולים להשפיע על כושרך לנהוג או להפעיל כמחנות. במקרה של חשש יש להתיעץ עם הרופא.

רביף מכיל בנייל אלקוחול

רביף מכיל 2.5 מ"ג בנייל אלקוחול ל- 0.5 מ"ל. אין לתת אותו לפגים ולילודים.

התכשיר עלול לגרום לתגובת רעילות ותגובות אלרגיות בתינוקות ובלדים מתחת לגיל 3 שנים.

- כיצד תשתמש בתרופה רביף?**

התרופה במזרק המוכן להזרקה הינה לשימוש חד פעמי.

התרופה במחסנית הינה לשימוש רב פעמי.

יתמיז יש להשתמש בתכשיר זה לפי הוראות הרופא. אם אינך בטוח, על־ך לבדוק זאת עם הרופא או הרוקם.

המיטון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

אין לעבור על המנהל המומלצת.

המיטון המקובל בדרך כלל הוא:

מטופלים אשר חוו סימן קליני בודד

המנה המומלצת הינה 44 מיקרוגרם (12 מיליון יחידות בינלאומיות) הניתנת 3 פעמים בשבוע.

מטופלים אשר חולים בטרשת נפוצה

המנה המומלצת הינה 44 מיקרוגרם (12 מיליון יחידות בינלאומיות) הניתנת 3 פעמים בשבוע.

מנה מופחתת של 22 מיקרוגרם (6 מיליון יחידות בינלאומיות) הניתנת 3 פעמים בשבוע, מומלצת במטופלים שאינם סובלים את המנה הגבוהה יותר.

יש להזריק רביף 3 פעמים בשבוע במידה וניתן:

- בשלושה ימים, בקטעים שבשבע (במרווחים של לפחות 48 שעות לדוגמה: ראשון, שלישי, חמישי)
- באותה שעה (עדרי בערב)

שימוש בילדים ובמתבגרים (בגילאי 17-2 שנים)

לא נערכו ניסויים קליניים רשמיים בילדים ובמתבגרים, אך ישנם נתונים קליניים ממחניים שפרופיל הבטיחות בילדים ובמתבגרים שמקבלים 22 מיקרוגרם או 44 מיקרוגרם שלוש פעמים בשבוע דומה לזה שנראה במבוגרים.

שימוש בילדים (מתחת לגיל שנתיים)

רביף אינו מומלץ לשימוש בילדים מתחת לגיל שנתיים.

אופן ההשימוש:

רביף מיועד להזרקה תת-עורית.

יש לבצע את ההזרקה באזנות ובנוכחות איש צוות רפואי.
לאחר שאתה, בן משפחה, חבר או מטפל שלך מוכן להזרקה מתאימה על השימוש במזרק רביף או במחסנית רביף שיש להכניסה למזרק המתאים, ניתן יהיה לבצע את ההזרקה של התכשיר בבית.

רביף מוגש:

- כמזרק** מומלא בתמיסה, מוכן להזרקה, למזרק מחוברת מחס המיועדת להזרקה עצמית תת-עורית (מתחת לעור), מזרק זה מיועד לשימוש חד פעמי. ניתן לשימוש גם עם מזרק עור (בריגלטק).
- למחסנית** שיש להכניסה לבאזור שהינו מקורן לקטיוני בשם רביסמארט המיועד למחסנית, להזרקה עצמית תת-עורית.
- התהייע עם הרופא שלך, מיה צורת ההזרקה המתאימה לך.

- הוראות שימוש ברביף, יש לקרוא בעיון את הוראות השימוש הבאות:**
- מחסנית רביף – יש לעיון בהוראות השימוש המלאות המצורפות עם המזרק האלקטרוני רביסמארט, עקוב אחרי הוראות אלו וחזרות**
- רביף במזרק מוכן להזרקה - ההוראות לפניך בעלון זה**

לפני הזרקה

- רחץ את ידריך היטב עם מים סובן.
- הוצא את מזרק או מחסנית הרביף מאריזתם על ידי קילוף הכיסוי הפלסטי.
- בדוק (מיד לאחר ההוצאה מהמקרק) שמזרק הרביף או המחסנית לא קפאו באריזתם או במשכריו. יש להשתמש רק בתמיסה צלולה ללא חלקיקים וזלל אולי סימני גריאה.
- עקוב אחרי הוראות השימוש.

כיצד להזריק רביף

- בבב באזור ההזרקה.** הרופא שלך יעזר לך אזורי ההזרקה אפטרשיים (אזורים מומלצים כללים את החלק העליון של ירך ואת הבטן התחתונה).
- אחוז את המזרק כפי שמחזיקים עפרון. מומלץ לערוך רישום של אזורי ההזרקה ולהחליפם בסבב, כדי לא להזריק לעיתים תכופות מדי באזור אחד וזאת כדי למעט את הסיכון לפגיעה ולנזק באזור ההזרקה.
- עצה:** אל תזריק באזורים בהם ניתן לחוש בגושים, נפיחות מקומית או בכאב. שוחם עם הרופא או עם האחיות, אם הך ממלה אזורים כאלה.
- לפני הזרקה,** השתמש בספוגית אלקוחול **לניקוי** העור באזור ההזרקה, ניתן לעורר להתייבש, אם נשאר אלקוחול על העור אתה עלול לחוש בצריבה.



- הוראות הזרקה במזרק מוכן להזרקה**
- יש לבצוב את העור שמסביב לאזור בעדינות (כדי להגביה אותו מעט), ראה איור מס' 1.
- כאשר שורש כף ירך מונח על העור, קרוב לאזור ההזרקה, החדר את המחט בזווית שקרה אל תוך העור בתנועה מהירה וזקוקה, ראה איור מס' 2.
- הזרק את התרופה על ידי חדירה איטית וציבה (דחוף את הבוכנה פנימה עד שהמזרק מתרוקן), ראה איור מס' 2.
- לחץ בעזרת הספוגית על אזור ההזרקה. הוצא את המחט מן העור.
- יש לטוט בעדינות את אזור ההזרקה עם ספוגית צמר גפן או גזה יבשות.
- יש להשליך את כל הפריטים לאחר שסיימת את ההזרקה.
- יש להשליך מיד בתום ההזרקה את המזרק למקום מתאים. את המחט יש להשליך לתוך כלי אסוף.

אם נרשם לך שימוש במחסנית, יש להחזיר אותה למכשיר ההזרקה האלקטרוני רביסמארט לפי ההוראות המצורפות למכשיר ההזרקה.

בדיקות ומעקב

בתקופת הטיפול יש לערוך בדיקות דם, תפקודי כבד ותפקודי בלוטת התריס (ראה גם סעיף 2).

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע לך מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיד של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת להשתמש ברביף

במקרה כזה יש להשתייך בהזרקה מהיום הבא של מנת הטיפול המתוכננת לפי המסטר הטיפול. אין להזריק והבא כפולה כדי להשלים את המנה שנשכחה.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול ללא התייעצות מקדימה עם הרופא שלך. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק את השימוש ברביף

ייתכן ולא תחוש בהשפעה של רביף באופן מידי. לכן, אל תפסיק להשתמש ברביף, אלא המשך להשתמש בתכשיר בכדי לקבל את התוצאה הממופה. אם אתה מוכן באופן, פנה לרופא. אין להפסיק את הטיפול מבלי להיוועץ ברופא.

אין להזריק רביף בחושך! בדוק את התוויות והמנה בכל פעם שהך נטול תרופה. הרכיב מספקיים אם הך זקוק להם. בכל שאלה נוספת לגבי השימוש ברביף פנה לרופא, לרוקם או לאחות.

- תופעות לוווי אפשריות**

כמו כל תרופה, השימוש בתרופה זו עלול לגרום לתופעות לוווי בחלק מהמשתמשים, אלו תבול למקור רשימת תופעות הלואו, ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

התקשר מיד לרופא שלך והפסק להשתמש ברביף אם הך מבחין בתופעות לוווי אחרות אלו:

- מקרים של **תגובות אלרגיות (רגישות יתר) חמורות.** אם מיד לאחר נטילת מנת רביף, אתה חש בקושי נשימה פתאומיים שיתכן ויהיו מלוים בנפיחים בפנים, בשפתיים, בלשון או בגרון, פריחה בעור (ספרדת), עקיצוץ בכל הגוף, חולשה ואובדן הכרה, במקרה שתופעות אלו מתרחשות, על־ך לפנות מיידית לרופא או לכל מרכז רפואי למצבי חירום. תופעות אלו נדירות (עוללות להתרחש אצל עד 1 מתוך 1,000 משתמשים).
- על־ך לדווח מיידית לרופא אם אתה מרגיש בתסמינים של **בעיות בכבד:** הצהבה של העור או של לבן העיניים, עקיצוץ מפושט, איבוד תיאבון המלווה בחילה והקאות וחבלות בעור. בעיות חמורות בכבד יכולות להיות קשורות לסימנים נוספים כגון: קשיי ריכוז, שינויות בלבול.
- דיכאון** יהיו שכח ויכול להתרחש אצל עד 1 מתוך 10 משתמשים)
- על־ך לדווח מיידית לרופא אם אתה מרגיש בתסמינים של **בעיות בלבד:** הצהבה של העור או של לבן העיניים, עקיצוץ מפושט, איבוד תיאבון המלווה בחילה והקאות וחבלות בעור. בעיות חמורות בכבד יכולות להיות קשורות לסימנים נוספים כגון: קשיי ריכוז, שינויות בלבול.
- דיכאון** יהיו שכח ויכול להתרחש אצל עד 1 מתוך 10 משתמשים)
- על־ך לדווח מיידית לרופא אם אתה מרגיש בתסמינים של **בעיות בכבד:** הצהבה של העור או של לבן העיניים, עקיצוץ מפושט, איבוד תיאבון המלווה בחילה והקאות וחבלות בעור. בעיות חמורות בכבד יכולות להיות קשורות לסימנים נוספים כגון: קשיי ריכוז, שינויות בלבול.

דיכאון יהיו שכח ויכול להתרחש אצל עד 1 מתוך 10 משתמשים)

על־ך לדווח מיידית לרופא אם אתה מרגיש בתסמינים של **בעיות בכבד:** הצהבה של העור או של לבן העיניים, עקיצוץ מפושט, איבוד תיאבון המלווה בחילה והקאות וחבלות בעור. בעיות חמורות בכבד יכולות להיות קשורות לסימנים נוספים כגון: קשיי ריכוז, שינויות בלבול.

דיכאון יהיו שכח ויכול להתרחש אצל עד 1 מתוך 10 משתמשים)

על־ך לדווח מיידית לרופא אם אתה מרגיש בתסמינים של **בעיות בכבד:** הצהבה של העור או של לבן העיניים, עקיצוץ מפושט, איבוד תיאבון המלווה בחילה והקאות וחבלות בעור. בעיות חמורות בכבד יכולות להיות קשורות לסימנים נוספים כגון: קשיי ריכוז, שינויות בלבול.

דיכאון יהיו שכח ויכול להתרחש אצל עד 1 מתוך 10 משתמשים)

על־ך לדווח מיידית לרופא אם אתה מרגיש בתסמינים של **בעיות בכבד:** הצהבה של העור או של לבן העיניים, עקיצוץ מפושט, איבוד תיאבון המלווה בחילה והקאות וחבלות בעור. בעיות חמורות בכבד יכולות להיות קשורות לסימנים נוספים כגון: קשיי ריכוז, שינויות בלבול.

דיכאון יהיו שכח ויכול להתרחש אצל עד 1 מתוך 10 משתמשים)

על־ך לדווח מיידית לרופא אם אתה מרגיש בתסמינים של **בעיות בכבד:** הצהבה של העור או של לבן העיניים, עקיצוץ מפושט, איבוד תיאבון המלווה בחילה והקאות וחבלות בעור. בעיות חמורות בכבד יכולות להיות קשורות לסימנים נוספים כגון: קשיי ריכוז, שינויות בלבול.

דיכאון יהיו שכח ויכול להתרחש אצל עד 1 מתוך 10 משתמשים)

על־ך לדווח מיידית לרופא אם אתה מרגיש בתסמינים של **בעיות בכבד:** הצהבה של העור או של לבן העיניים, עקיצוץ מפושט, איבוד תיאבון המלווה בחילה והקאות וחבלות בעור. בעיות חמורות בכבד יכולות להיות קשורות לסימנים נוספים כגון: קשיי ריכוז, שינויות בלבול.

דיכאון יהיו שכח ויכול להתרחש אצל עד 1 מתוך 10 משתמשים)

על־ך לדווח מיידית לרופא אם אתה מרגיש בתסמינים של **בעיות בכבד:** הצהבה של העור או של לבן העיניים, עקיצוץ מפושט, איבוד תיאבון המלווה בחילה והקאות וחבלות בעור. בעיות חמורות בכבד יכולות להיות קשורות לסימנים נוספים כגון: קשיי ריכוז, שינויות בלבול.

דיכאון יהיו שכח ויכול להתרחש אצל עד 1 מתוך 10 משתמשים)

על־ך לדווח מיידית לרופא אם אתה מרגיש בתסמינים של **בעיות בכבד:** הצהבה של העור או של לבן העיניים, עקיצוץ מפושט, איבוד תיאבון המלווה בחילה והקאות וחבלות בעור. בעיות חמורות בכבד יכולות להיות קשורות לסימנים נוספים כגון: קשיי ריכוז, שינויות בלבול.

דיכאון יהיו שכח ויכול להתרחש אצל עד 1 מתוך 10 משתמשים)

על־ך לדווח מיידית לרופא אם אתה מרגיש בתסמינים של **בעיות בכבד:** הצהבה של העור או של לבן העיניים, עקיצוץ מפושט, איבוד תיאבון המלווה בחילה והקאות וחבלות בעור. בעיות חמורות בכבד יכולות להיות קשורות לסימנים נוספים כגון: קשיי ריכוז, שינויות בלבול.

דיכאון יהיו שכח ויכול להתרחש אצל עד 1 מתוך 10 משתמשים)

על־ך לדווח מיידית לרופא אם אתה מרגיש בתסמינים של **בעיות בכבד:** הצהבה של העור או של לבן העיניים, עקיצוץ מפושט, איבוד תיאבון המלווה בחילה והקאות וחבלות בעור. בעיות חמורות בכבד יכולות להיות קשורות לסימנים נוספים כגון: קשיי ריכוז, שינויות בלבול.

דיכאון יהיו שכח ויכול להתרחש אצל עד 1 מתוך 10 משתמשים)

על־ך לדווח מיידית לרופא אם אתה מרגיש בתסמינים של **בעיות בכבד:** הצהבה של העור או של לבן העיניים, עקיצוץ מפושט, איבוד תיאבון המלווה בחילה והקאות וחבלות בעור. בעיות חמורות בכבד יכולות להיות קשורות לסימנים נוספים כגון: קשיי ריכוז, שינויות בלבול.

דיכאון יהיו שכח ויכול להתרחש אצל עד 1 מתוך 10 משתמשים)

על־ך לדווח מיידית לרופא אם אתה מרגיש בתסמינים של **בעיות בכבד:** הצהבה של העור או של לבן העיניים, עקיצוץ מפושט, איבוד תיאבון המלווה בחילה והקאות וחבלות בעור. בעיות חמורות בכבד יכולות להיות קשורות לסימנים נוספים כגון: קשיי ריכוז, שינויות בלבול.

דיכאון יהיו שכח ויכול להתרחש אצל עד 1 מתוך 10 משתמשים)

על־ך לדווח מיידית לרופא אם אתה מרגיש בתסמינים של **בעיות בכבד:** הצהבה של העור או של לבן העיניים, עקיצוץ מפושט, איבוד תיאבון המלווה בחילה והקאות וחבלות בעור. בעיות חמורות בכבד יכולות להיות קשורות לסימנים נוספים כגון: קשיי ריכוז, שינויות בלבול.

דיכאון יהיו שכח ויכול להתרחש אצל עד 1 מתוך 10 משתמשים)

על־ך לדווח מיידית לרופא אם אתה מרגיש בתסמינים של **בעיות בכבד:** הצהבה של העור או של לבן העיניים, עקיצוץ מפושט, איבוד תיאבון המלווה בחילה והקאות וחבלות בעור. בעיות חמורות בכבד יכולות להיות קשורות לסימנים נוספים כגון: קשיי ריכוז, שינויות בלבול.

דיכאון יהיו שכח ויכול להתרחש אצל עד 1 מתוך 10 משתמשים)

על־ך לדווח מיידית לרופא אם אתה מרגיש בתסמינים של **בעיות בכבד:** הצהבה של העור או של לבן העיניים, עקיצוץ מפושט, איבוד תיאבון המלווה בחילה והקאות וחבלות בעור. בעיות חמורות בכבד יכולות להיות קשורות לסימנים נוספים כגון: קשיי ריכוז, שינויות בלבול.

דיכאון יהיו שכח ויכול להתרחש אצל עד 1 מתוך 10 משתמשים)

על־ך לדווח מיידית