



אוגוסט 2019

רופא/ה נכבד/ה,  
רוקח/ת נכבד/ת,

## חברת רז רוקחות מבקשת להודיעכם על עדכון העלון לרופא של התכשיר: **Furosemide S.A.L.F 20mg/2ml**

בהודעה זו מצוינים רק הסעיפים בהם נעשו שינויים מהותיים בעלון לרופא. התוספות סומנו בצבע, המחיקות סומנו בצבע אדום עם קו מחיקה. העלון המעודכן נשלח למשרד הבריאות לצורך פרסומו במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות: [www.health.gov.il](http://www.health.gov.il) וניתן לקבלו מודפס על ידי פנייה לבעל הרישום: רז רוקחות בע"מ, רחוב המתכת 6, א.ת. קדימה.

בברכה,  
אריאל מימון  
רוקחת ממונה

### FUROSEMIDE S.A.L.F 20MG/2ML

מרכיב פעיל וחוזק:  
Furosemide 20mg/2ml

#### התוויה מאושרת:

Furosemide S.A.L.F 20 mg/2ml is a potent diuretic indicated for use when a prompt and effective diuresis is required. Furosemide S.A.L.F 20mg/2ml is appropriate for use in emergencies or when oral therapy is not feasible. Indications include cardiac, pulmonary, hepatic and renal edema.

#### העדכונים בעלון לרופא:

##### 6.2 Incompatibilities

Furosemide S.A.L.F 20 mg/2 ml can be diluted with glucose 5%, [isotonic sodium chloride](#) or Ringer lactate solutions.

Furosemide S.A.L.F 20mg/2ml solution should not be mixed with any other drugs in the injection bottle (see clause 6.6).

##### 6.6 Special precautions for disposal and other handling

Furosemide S.A.L.F 20 mg/2 ml can be diluted with glucose 5%, [isotonic sodium chloride](#) or Ringer lactate solutions.

In case of dilution: Do not freeze. The product is stable for 8 hours with no special storage conditions, but from a microbiological point of view, the product should be used immediately.

If not used immediately, in-use storage times and conditions are the responsibility of the user.

For single use only.

Furosemide S.A.L.F 20 mg/2 ml solution should not be mixed with any other drugs in the injection bottle.

רז רוקחות בע"מ, בנין "רז פרוגרס", רחוב המתכת 6, אזה"ת קדימה.  
טל': 09-8307301; פקס: 09-8987883; מייל: [pharma@razprogress.com](mailto:pharma@razprogress.com)