



רופא/ה נכבד/ה
רוקח/ת נכבד/ה,

תכשיר חדש

ABILIFY 5 mg / 10 mg / 15 mg/ 30 mg tablets אביליפיי 5 מ"ג / 10 מ"ג / 15 מ"ג / 30 מ"ג טבליות

ברצוני להודיעכם שמשרד הבריאות אישר את התכשיר Abilify מתוצרת Bristol-Myers squibb
כל טבליה מכילה: Aripiprazole 5, 10, 15, 30 mg בהתאמה

נוסח ההתוויה המאושר לתכשיר:

ABILIFY is indicated for the treatment of schizophrenia. ABILIFY is indicated for the treatment of moderate to severe manic episodes in Bipolar I Disorder and for the prevention of a new manic episode in patients who experienced predominantly manic episodes and whose manic episodes responded to aripiprazole treatment

ABILIFY שייך לקבוצה תרופונית: אנטי-פסיכוטיים אטיפים.
פעילות רפואית: Aripiprazole מוכח לטיפול:

■ בסכיזופרניה לגיל 15 ומעלה

■ במצבי מאניה בדרגת חומרה בינונית עד קשה במסגרת מחלה בי-פולר סוג 1.

■ למניעה של התקפים מאנים חדשים במטופלים שעיקר מחלתם התקפים מאנים ועברו התקפי מניה קודמים שהגיבו בעבר לטיפול באריפירזול.
המינון מחושב באופן אינדיבידואלי לכל חולה לפי מצבו הרפואי ונלקח פעם ביום: סכיזופרניה: מינון התחלתי 15-10 מ"ג ובהמשך 15 מ"ג ביום. אין לעבור מינון מעל 30 מ"ג בכל יום. **התקפי מניה פעילים:** 15 מ"ג ביום. אין לעבור מינון של 30 מ"ג בכל יום. **מניעת התקפי מניה:** יש להמשיך באותה רמת המינון. ABILIFY נכלל בסל הבריאות לטיפול בחולי סכיזופרניה.

תכשיר חדש

ORENCIA 250 mg powder for concentrate for solution for infusion אורנסיה 250 מ"ג אבקה מרוכזת להמסה למתן באינפוזיה

ברצוני להודיעכם שמשרד הבריאות אישר את התכשיר ORENCIA מתוצרת Bristol-Myers squibb המכיל:

Each vial contains 250 mg of abatacept.

Each ml contains 25 mg of abatacept, after reconstitution.

נוסח ההתוויה המאושר לתכשיר:

Orencia in combination with methotrexate is indicated for the treatment of moderate to severe active rheumatoid arthritis in adult patients who have had an insufficient response or intolerance to other disease-modifying anti-rheumatic drugs including at least one tumour necrosis factor (TNF) inhibitor. A reduction in the progression of joint damage and improvement of physical function have been demonstrated during combination with abatacept and methotrexate.

המינון מחושב בהתאם למשקל גוף לכל חולה וניתן כאינפוזיה למשך 30 דקות בתדירות של פעם בכל 4 שבועות.

Abatacept is a fusion protein that consists of the extracellular domain of human cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4 (CTLA-4) linked to a modified Fc portion of human immunoglobulin G1 (IgG1).

Mechanism of action: Abatacept selectively modulates a key costimulatory signal required for full activation of T lymphocytes expressing CD28. Full activation of T lymphocytes requires two signals provided by antigen presenting cells: recognition of a specific antigen by a T cell receptor (signal 1) and a second costimulatory signal. A major costimulatory pathway involves the binding of CD80 and CD86 molecules on the surface of antigen presenting cells to the CD28 receptor on T lymphocytes (signal 2). Abatacept selectively inhibits this costimulatory pathway by specifically binding to CD80 and CD86.

העלון לרופא ולצרכן מפורסמים במאגר התרופות באתר משרד הבריאות, ניתן לקבלם מודפסים ע"י פניה לנציג בעל הרישום ביוטיס בע"מ, רח' המלאכה 22, ראש העין 48091.

בברכה,

גאי וגנר, רוקח ממונה
BMS ישראל/ביוטיס