

* **(Dabigatran) Pradaxa - אינטראקציות בין-תרופתיות פוטנציאליות**

המידע לגבי נוגדני הקרישה החדשים בכל הקשור לאינטראקציות בין-תרופתיות מוגבל. הספיגה של Dabigatran מתווכת ע"י P-glycoprotein (P-gp), ולכן מעכבי P-gp עלולים להגביר את ספיגתו וכתוצאה מכך להעלות את ריכוזו בדם. לעומת זאת, P-gp Inducers עלולים להקטין את ספיגתו וריכוזו בדם.

לגורמים כמו תפקוד כלייתי ופורמולצייית-התרופה (שחרור מיידי או מושהה) תרומה נכבדה לקביעת המשמעות הקלינית של האינטראקציה הפוטנציאלית.

הטבלה הבאה כוללת רשימת תרופות, שרצוי לעקוב אחר ההנחיות, ואם אין כאלה, יש לנקוט במשנה זהירות.

קבוצה פרמקולוגית	שם התרופה	השפעה פרמקולוגית	המלצות/הערות
P-gp Inhibitors	Abiraterone	עליה בריכוז Dabigatran (Variable)	* יש להימנע משילוב בחולים עם אי ספיקת כליות חמורה (CrCl <30 ml/min) * אם אי אפשר להימנע משילוב עם Ketoconazole ו-Dronedarone יש הממליצים להפחית את המינון של Dabigatran ל-75mgX2/day. במקרים בהם חובה לטפל בשילוב, מומלץ ליטול Dabigatran שעתיים לפני P-gp Inhibitors
	Lapatinib		
	Mefloquine		
	Mifepristone		
	Nifedipine		
	Nilotinib		
	Posaconazole		
	Propafenone		
	Propranolol		
	Quinidine		
	Quinine		
	Simvastatin		
	Sunitinib		
	Tacrolimus		
	Tamoxifen		
	Ticagrelor		
	Ulipristal		
Vemurafenib			
Verapamil			
P-gp Inducers	Carbamazepine	ירידה בריכוזי Dabigatran ההשפעה יכולה להיות ממושכת למס' שבועות לאחר הפסקת התרופות הנ"ל	הימנע משילוב
	Phenobarbital		
	Phenytoin		
	Rifampicin		
	St-John's Wort		
Antacid	H2-Blockers	ירידה קלה בריכוז Dabigatran	במידת האפשר, רצוי ליטול Dabigatran שעתיים לפני התרופות הנ"ל
	Famotidine		
	Ranitidine		
Anti-Platlet	Aspirin	אינטראקציה פרמקודינמית	יש לנטר את החולה להופעת דימומים
	Clopidogrel		
NSAID'S		אינטראקציה פרמקודינמית	יש לנטר את החולה להופעת דימומים

* הרשימה היא חלקית ואינה מצביעה בהכרח על הוראות נגד.