

תרופות ורעילות לציפורניים

תרופות רבות עלולות לגרום שינויים בציפורניים. השינויים מופיעים בדרך כלל סמוך לנטילת התרופה בחלק או בכל הציפורניים. חלק מהשינויים אסימפטומטיים ומהווים בעיה קוסמטית בלבד, בעוד אחרים גורמים כאב ואי-נוחות (דלקת, נמק, היפרדות הציפורן מבסיסה וכד'). השינויים בציפורניים הם בדרך כלל זמניים ונעלמים עם הפסקת הטיפול, אך חלקם ימשכו זמן רב. השינוי בציפורניים תלוי באזור הציפורן שייפגע ע"י התרופה. להלן רשימת תרופות המתבססת על תיאורי מקרה בהם נגרמו השפעות לוואי שהתבטאו בציפורניים.

Anti-Neoplastic Agents	Mitomycin	Miscellaneous
(Arsenic)	Mitoxantrone	Acebutolol
Bleomycin	Paclitaxel	Acitretin
Busulphan	Pemetrexed	Amlodipine
Capecitabine	Sorafenib	Azathioprine
Cetuximab	Sunitinib	Captopril
Cisplatin	Topotecan	Cyclosporin
Cyclophosphamide	Vincristine	Enalapril
Cytarabine		Hydroxychloroquine
Dacarbazine	Anti Infective	Isotretinoin
Dactinomycin	Cephalexin	Levodopa
Daunorubicin	Cloxacillin	Lithium
Doxcetaxel	Co-Trimoxazole	Losartan
Doxorubicin	Doxycycline	Mycophenolate
Etoposide	Erythromycin	Octreotide
Fluorouracil	Minocycline	Oral-Cotraceptives
Gefitinib	Moxifloxacin	Penicillamine
Hydroxyurea	Ofloxacin	Propyl Thiouracil
Idarubicin	Roxithromycin	Psoralen(Methoxalen)
Imatinib		Valsartan
Lapatinib	Itraconazole	
Melphalan	Fluconazole	
Mercaptopurine	Zidovudine	
Methotrexate	Indinavir	

References:

1. Beilinson D.I File
2. Reactions on line
3. J oncol Pharm Praticce 15: 143-155, 2009