

Diprosalic Lotion: הנדון:
דיפרוסליק תרחיץ
עדכונים מהותיים בעלון לצרכן

Dosage form: Lotion/תרחיץ

Composition: Betamethasone Dipropionate 0.64 mg (equivalent to 0.5 mg Betamethasone)
Salicylic Acid 20 mg

שלום רב,

**חברת אורגנון פארמה ישראל בע"מ, מבקשת ליידע על עדכון העלון לצרכן של התכשיר שבנדון.
ההתוויה הרשומה לתכשיר בישראל:**

Diprosalic Lotion provides anti inflammatory, antipruritic, anti allergic and chronic hyperkeratotic and dry keratolytic activity in the topical management of subacute dermatoses responsive to corticosteroid therapy.

בהודעה זו מצוינים ומוארים ברקע צהוב רק שינויים מהותיים בעלון לצרכן.
למידע מלא ולהוראות מתן מפורטות יש לעיין בעלון לרופא ובעלון לצרכן המאושרים על ידי משרד הבריאות.
העלון לרופא והעלון לצרכן נשלחו לפרסום במאגר התרופות שבאתר האינטרנט של משרד הבריאות, וניתן לקבלם מודפסים על ידי פניה לבעל הרישום, חברת אורגנון פארמה ישראל, במייל: organon.ra.israel@organon.com.

Diprosalic Lotion מופץ ע"י חברת נובולוג בע"מ.

בברכה,

עלמה שימן
רוקחת ממונה
אורגנון פארמה ישראל

עדכונים מהותיים בעלון לצרכן:

2.2 אזהרות מיוחדות בנוגע לשימוש בדיפרוסאליק תרחיץ
דבר עם הרופא שלך או הרוקח לפני שימוש בדיפרוסאליק תרחיץ.

אם יש לך פסוריאזיס, ייתכן שהרופא שלך ירצה לבחון את הטיפול שלך באופן קבוע. צור קשר עם הרופא שלך אם הפסוריאזיס שלך מחמיר או שאתה מפתח בליטות מורמות מלאות מוגלה מתחת לעור שלך.
צור קשר עם הרופא שלך, אם אתה או ילדך חווים ראייה מטושטשת או הפרעות ראייה אחרות.
אין להשתמש בתרופה זו תחת תחבושות או פלסטרים.
תופעות לוואי שעלולות להתרחש עם קורטיקוסטרואידים הניתנים בשאיפה או דרך הפה, עלולות להתרחש גם עם קורטיקוסטרואידים בשימוש על העור, במיוחד בפעוטות ובילדים.
אם אתה משתמש ביותר תרחיץ מהכמות הנכונה ו/או אתה משתמש בו במשך זמן רב יותר מהמומלץ, הדבר יכול להשפיע על הרמות של הורמונים מסוימים בגוף, במיוחד בפעוטות ובילדים.
במבוגרים, השינויים ברמות ההורמונים עלולים להוביל לעיתים נדירות לנפיחות או התעגלות הפנים, לחולשה, לעייפות ולסחרחורת כאשר נעמדים או מתיישבים.

3 ילדים

אם אתה משתמש ביותר תרחיץ מהכמות הנכונה ו/או אתה משתמש בו במשך זמן רב יותר מהמומלץ, הדבר יכול להשפיע על ההורמונים של ילדך. לעיתים נדירות הדבר יגרום ל:

- עיכוב בגדילה ובהתפתחות
- נפיחות או התעגלות הפנים
- הצטברות של לחץ סביב המוח שעלול לגרום ל:

- בליטה של הפונטנלה (הנקודה הרכה בחלק העליון של הגולגולת) בתינוקות
- כאב ראש הולם מתמיד
- ראייה מטושטשת או הפרעות ראייה אחרות

3. כיצד להשתמש בדיפרוסאליק תרחיץ?

עליך לפעול תמיד לפי הוראות אלה בזמן שימוש בדיפרוסאליק תרחיץ:

- אין להשתמש בכמות גדולה של תרחיץ למשך זמן רב (לדוגמא בכל יום למשך שבועות או חודשים רבים).
- הימנע ממגע של התרחיץ בתוך העיניים שלך או בתוך האף או הפה.