



עלון לצריכן לפי תקנות הרוקחים (תקשיירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

בנלייטה תת-עוררי 200 מ"ג

תמישה להזרקה בעט מזרק מוכן לשימוש

כל עט מזרק מוכן לשימוש של 1 מ"ל מכיל 200 מ"ג בלימומאב (Belimumab 200 mg).

לרשימת החומרים הבלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר, ראה סעיף 2 - "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 - "מידע נוספת".
קרא בעיון את העلون עד סוףו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה בעברך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

בנלייטה תת-עוררי 200 מ"ג מיועדת כתוספת טיפול במטופלים מבוגרים עם זאבת (לופוס) אדמנתיית מערכתית (SLE) פעילה, חיובית לנוגדים אוטואימוניים, עם רמת פעילות גבוהה של המחלת (למשל נוכחות נוגדים נגד DN'A דו גידילי (dsDNA) ורמת משלים נמוכה (Sos)) (complement), למרות הטיפול הרגיל.

בנלייטה מיועדת לטיפול במטופלים מבוגרים עם זאבת (לופוס) נפריטיס פעילה בשילוב עם טיפולים מדכאי מערכת חיסון.

קבוצה רפואיית: מדכאי חיסון סלקטיבי.
זאבת היא מחלת שבה מערכת החיסון (המערכת שנלחמת בזיהום) תוקפת את התאים והרקמות שלך, וגורמת לדלקת ולפגיעה באיברים. המחלת יכולה לפגוע כמעט בכל איבר בגוף וחוشبים שהוא קשורה לסוג של תא דם לבנים, הנקראים תא B.
בנלייטה תת-עוררי 200 מ"ג מכילה בלימומאב (נוגדן מונוקולונאלי אנושי). הוא מפחיתה את מספר תא B בכך באמצעות חסימת הפעילות של SLY, חלבון העוזר לתאי B להיות זמן רב יותר ונמצא ברמות גבוהות באנשים עם זאבת.
אתה תקבל בנלייטה תת-עוררי 200 מ"ג בנוסף לטיפול הרגיל שלך לזאבת.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לבלימומאב או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (המפורטים בסעיף 6).
- ← בדוק עם הרופא שלך אם ייתכן שהוא חל עלייך.

ażeroth miyadot ha-nogevot li-shimush bat-rofah

l-pni h-tipol b-bnlystah t-t-uori 200 m"g, sefer l-rofa am:

- יש לך כרגע זיהום או אם יש לך זיהום מתחנש או אם אתה סובל מזיהומיים לעתים קרובות. הרופא יחליט אם ניתן לתת לך בnlishta t-t-uori 200 m"g.
 - אתה מתכוון להתחסן או שהתחסנת ב- 30 הימים האחרונים. ישנים חיסוניים שאתה לא שמעם בסמוך או במהלך הטיפול בnlishta t-t-uori 200 m"g.
 - הזאת משפיעה על מערכת העצבים שלך.
 - אתה נשא של HIV (נגיף החיסוני האנושי) או אם יש לך רמות נמוכות של אימונוגLOBולינים.
 - יש לך אוเคย הייתה לך דלקתCBD נגיפית מסוג B או C.
 - עברת השתלה איברים או מה עצם או תא גזע.
 - היה לך סרטן.
- ← **sefer l-rofa am yitcan shachd mala chal ulir.**

dicano v-hata'abot

קיימים דיווחים על dicano, מחשבות אובדן, וניסיונות התאבדות לרבות התאבדות במהלך הטיפול עם bnlystah. Sefer l-rofa am yis lek historiya shel matzivim ala. Am atah chash bat-simanim chadshim au hachmara bat-simanim b-cel zman she-ho:

← פנה לרופא או גש מיד לבית החולים.
אם אתה מודока או שיש לך מחשבות לפגוע בעצמך או להatta, yitcan shatma'za sheha mou'il le-sefer l-krov meshpachah au chaver krov v-lbokh mahan l-kroa ulon zo. Tovol l-bokh mahan l-omer lek am hem modagim lagavi shivuyim b-matziv hroch au hatahnugot shel.

shim lib bat-simanim chobavim

מטופלים הנוטלים תרופות המשפיעות על מערכת החיסון שלהם עלולים להיות בסיכון מוגבר להידבק בזיהומיים, כולל בזיהום מוחי נדרי אך חמורי לויקואנטפלופתיה רב מוקדית מתקדמת.

(PML - Progressive Multifocal Leukoencephalopathy).

← **lemidu nusaf kra al "sicun mogbar li-zehom moch" basuf 4 be-ulon zo.**

ilidim v-matbagrim

אל ניתן בnlishta t-t-uori 200 m"g לילדים או למתבגרים מתחת לגיל 18.

aintrakziot/tgbovet b-in tirofot

אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, sefer ul kr l-rofa eo l-roka. B'miyad am atah lokh tirofot meshpuyot ul myurah chiszon, kollel kol tirofa meshpuya ul tai B (meshmat ltipol b-sertan eo b-macholot dalkhot).

← השימוש בתרופות כאלה בשילוב עם bnlystah t-t-uori 200 m"g עלול לגרום למערכת החיסון להיות פחות יעילה. הדבר עלול להעלות את sicun shel h-yiduk b-zehom chmor.

היריון והנקה

אמצעי מניעה בנשים בגיל הפוריות

השתמשי באמצעי מנעה יעיל במהלך הטיפול בבלביסטה תת-עוררי 200 מ"ג ובמהלך 4
חודשים לפחות לאחר המנה האחרונה.

היריון

בדרכּ כלל, בבלביסטה תת-עוררי 200 מ"ג אינה מומלצת אם את בהיריון.

• **ספרי לרופא אם את בהיריון,** אם את חושבת שאות בהיריון או אם את מתכוננת להרות.

הרופא יחולט אם את יכולה להשתמש בבלביסטה תת-עוררי 200 מ"ג.

• **אם כניסה להיריון בזמן שתת-עירור 200 מ"ג, ספרי על כך לרופא.**

הנקה

ספרי לרופא אם את מניקה. סביר להניח שבבלביסטה תת-עוררי 200 מ"ג יכולה לעבור לחלב
האם. הרופא ישוחח איתך האם עלייך להפסיק את הטיפול בבלביסטה תת-עוררי 200 מ"ג
בזמן שתת-מניקה או האם עלייך להפסיק להניק.

נהיגה ושימוש במכונות

בלביסטה תת-עוררי 200 מ"ג יכולה לגרום לתופעות לוואי העוללות לפגוע ביכולתך לנוהג
או להשתמש במכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

בלביסטה תת-עוררי 200 מ"ג מכילה פחות מ- 1 מילימול נתרן (23 מ"ג) למנה, לכן התרופה
נחשבת נטולת נתרן.

3. כיצד השתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עלייך לבדוק עם הרופא או הרוקח
אם איןך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

בלביסטה תת-עוררי 200 מ"ג ניתנת בזריקה מתחת לעור באותו היום בכל שבוע.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

זאבת (לופוס) אדמנתיית מערכית (SLE)

המינון המקובל בדרך כלל הוא: 200 מ"ג (תוכלה מלאה של עט אחד) פעם בשבוע.

זאבת (לופוס) נפריטים

המינון המקובל עשוי להשתנות. הרופא יקבע את המינון הנכון בשביילר, שהוא:

• מנה של 200 מ"ג (תוכן מלא של עט אחד) פעם בשבוע.

או

• מנה של 400 מ"ג (תוכן מלא של שני עטים בפעם אחת) פעם בשבוע במשך 4 שבועות.

במהלך, המינון המומלץ הוא 200 מ"ג (תוכן מלא של עט אחד) פעם בשבוע.

אם אתה מעוניין לשנות את יום הזרקה:
הזרק מנה ביום החדש (אפילו אם עבר פחות משבוע מהמנה האחרונה שלך). מאותו יום המשך עם לוח הזמנים השבועי החדש.

הזרקת בנליסטה תת-עוררי 200 מ"ג:

האחות או הרופא יראו לך או למי שמטפל לך כיצד להזריק בנליסטה תת-עוררי 200 מ"ג. הזריקה הראשונה עם עט המזורך המוכן לשימוש של בנליסטה תת-עוררי 200 מ"ג תהיה תחת השגחה של האחות או הרופא. לאחר שידריכו אותך כיצד להשתמש בעט, האחות או הרופא יכולים להחליט שאתה יכול להזריק לעצמך או שהמטפל שלך יוכל להזריק לך. האחות או הרופא גם יינחו אותך לאילו סימנים ותסמינים יש לשים לב כאשר משתמשים בנליסטה תת-עוררי 200 מ"ג, מכיוון שיכולות להופיע תגבות אלרגיות חמורות (ראה בסעיף 4 "תגבות אלרגיות").

יש להזריק בנליסטה תת-עוררי 200 מ"ג מתחת לעור באזור הבطن או באזור הירך. בנליסטה תת-עוררי 200 מ"ג היא זריקת תת עורית ואסורה להזריק אותה לתוך הוריד (V.I.). הוראות שלב אחר שלב להזרקה בעט המזורך המוכן לשימוש נמצאות בסוף העלון זהה.

אין לעبور על המנה המומלצת.

אם נטلت בטעות מינון גבוה יותר של בנליסטה תת-עוררי 200 מ"ג
עליך לפנות מיד לרופא או לאחות שישגיחו عليك במקרה שתפתח סימנים או תסמינים של תופעות לוואי, ושיטפלו בתסמינים אלו במידת הצורך. במידת האפשר, הראה להם את הארידזה או את העלון הזה.
אם נטلت מנת יתר או אם בטעות בעלILD מני התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מيون של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחתי להשתמש בבנלייטה תת-עוררי 200 מ"ג
הזרק את המנה ששכחתי ברגע שנזכرت. לאחר מכן המשך עם לוח הזמנים השבועי הרגיל או התחילה לוח זמנים שבועי חדש שתחלתו מיהי מחרזת את המנה שנשכחה.
אם לא הבחנתה שהחמצת מנה עד הגיעו בו הגיע הזמן למנעה הבאה, הזרק רק את המנה הבאה כמתוכנן.
יש להתמיד לטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

הפסקת הטיפול בבנלייטה תת-עוררי 200 מ"ג

גם אם חיל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא הティיעצות עם הרופא.

הרופא יחליט אם עליך להפסיק להשתמש בנליסטה תת-עוררי 200 מ"ג.
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנק נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנתק Zukot להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ רפואי או ברוקת.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בנליסטה תת-עוררי 200 מ"ג עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל במקרה רשות תופעות הלואוי. ייתכן שלא תסבול מכך אף אחת

מהן.

תגבות אלרגיות - פנה מיד לקבלת סיוע רפואי
בנלייטה תת-עוררי 200 מ"ג עלולה לגרום לתגבה לזריקה, או לתגבה אלרגית (רגישות יתר). אלו תופעות לוואי שכיחות (עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 10 אנשים). לעיתים תופעות אלו עלולות להיות חמורות (תופעות לוואי שאין שכיחות, עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 100 אנשים), והן עלולות להיות מסכנות-חיים. סביר יותר שתופעות חמורות אלו תתרחשנה ביום של הטיפול הראשון או השני עם בנלייטה תת-עוררי 200 מ"ג, אולם הן יכולות להתעכב ולהתרחש מספר ימים אחר כך.

ספר מיד לאחות או לרופא, או פנה לחדר מיון בבית-החולים הקרוב, אם אתה חש באחד מהתסминים הבאים של>tagבה אלרגית או-tagבה לזריקה:

- נפיחות של הפנים, השפתיים, הפה או הלשון
- צפופים בנשימה, קשיים בנשימה או קוצר נשימה
- פריחה
- גבושיםות מוגדרות בעור או חרפת

לעתים נדירות, תגבות מאחרות פחות חמורות לבנלייטה עלולות להתרחש גם כן, בדרך כלל חמישה עד עשרה ימים לאחר הזריקה. הן כוללות תסמינים כגון פריחה, בחילה, עייפות, כאבי שרירים, כאבי ראש, או נפיחות של הפנים.

אם אתה חווה תסמינים אלו, במיוחד אם אתה חווה יחד שני תסמינים או יותר:
← **ספר מיד לאחות או לרופא.**

זיהומיים

בנלייטה תת-עוררי 200 מ"ג עלולה לגרום לך להידבק בזיהומיים בסביבות גבואה יותר מכל זיהומיים בדרכי השתן והנשימה. אלה תופעות לוואי שכיחות מאוד ועלולות להופיע על יותר מ- 1 מתוך 10 אנשים. חלק מהזיהומיים עלולים להיות חמורים ולגרום למומות בשכיחות נמוכה.

אם אתה חווה אחד מהתסминים הבאים של **זיהום**:

- חום ו/או צמרמות
 - שיעול, בעיות נשימה
 - שלשול, הקאה
 - תחושת צריבה בזמן מתן שתן; מתן שתן לעתים תכופות
 - עור חם, אדום או כואב או פצעים בגוף.
- ← **ספר מיד לאחות או לרופא.**

דיכאון והתאבדות

קיים דיווחים על דיכאון, מחשבות אובדן, וניסיונות התאבדות במהלך הטיפול עם בנלייטה. דיכאון יכול להופיע ב- עד 1 מכל 10 אנשים, מחשבות אובדן וניסיונות התאבדות יכולים להופיע ב- עד 1 מכל 100 אנשים. אם אתה מודאג, יש לך מחשבות לפגוע בעצמך או מחשבות מטרידות אחרות, או אם אתה מודאג ומבחן שהרגשתך מחמירה או שאתה מפתח תסמינים חדשים:

← פנה לרופא או גש מיד לבית החולים.

סיכון מוגבר לziehoms מוחי:

תרופות המחלישות את מערכת החיסון, כגון בנליסטה תת-עוררי 200 מ"ג, עלולות לשים אותך בסיכון מוגבר להידבק בziehoms מוחי נדרי אך חמור ומסכן חיים הקרוי PML - **L**eukoencephalopathy (Leukoencephalopathy).

תסמינים של לוקואנצלופתיה רב מוקדית מתקדמת:

- אובדן זיכרון
- קושי לחשוב
- קושי לדבר או ללכט
- אובדן ראייה

← **ספר לרופא מיד** אם אתה חווה אחד מתחומיים אלו, או בעיות דומות שנמשכו מעל למספר ימים.

אם כבר חוותה תסמים אלו לפני תחילת הטיפול עם בנליסטה תת-עוררי 200 מ"ג:

← **ספר מיד לרופא** אם אתה מבחין בשינויים כלשהם בתסמים אלה.

תופעות לוואי נוספות:

תופעות לוואי שכיחות מאוד

אליה עלולות להופיע ב- יותר מ 1 מכל 10 אנשים:

- ziehomsים חידקניים (ראה פסקה "ziehomsים" לעיל)

תופעות לוואי שכיחות

אליה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 10 אנשים:

- חום גבוה
- תగבות באזור ההזרקה, לדוגמה: פריחה, אדמומיות, גרד או נפיחות של העור במקום בו הזרקת בנליסטה תת-עוררי 200 מ"ג
- פריחה גבשושית ומגרדת (חרלה), פריחה בעור
- ספירה נמוכה של תאי דם לבנים (ניתן להבחין בבדיקה דם)
- ziehoms באף, בגרון או בקיבה
- כאב בידים או בכפות הרגליים
- מיגרנה
- בחילה, שלשול

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי חמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה לעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על

תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקורי לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה ל קישור:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומ סגור מחוץ להישג ידם וטוח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן במקדר (בין 2°C ל-8°C).
- אין להקפיא.
- יש לאחסן באזירה המקורי כדי להגן מפני אור.
- יש להוציא מהמקרר 30 דקות לפני השימוש.
- ניתן לאחסן את העט מזרק המוכן לשימוש בטמפרטורת החדר (עד 25°C) כשהוא מוגן מאור במשך 12 שעות לכליותר. לאחר הוצאתו מהמקרר **יש להשתמש בו תוך 12 שעות או להשילכו.**
- אין להשליך תרופות לבזבז או לפסולת הביתייה. הטייעץ עם הרוקח כיצד לזרוק תרופות שאין בשימוש. צעדים אלו יסייעו להגנה על הסביבה.

6. מידע נוסף

- נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

Sodium Chloride, L-Arginine Hydrochloride, L-Histidine
Monohydrochloride, L-Histidine, Polysorbate 80, Water for Injection

"ראה בסעיף 2 מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה"

- כיצד נראה התרופה ומה תוכן האזירה:
בנלייטה תה-עוררי 200 מ"ג משוקת בעט מזרק מוכן לשימוש, המכיל 1 מ"ל תמייסה נטולת צבע עד צהבהבה בצבעה, לשימוש חד-פעמי.
כל אריזה מכילה 1 עט מזרק מוכן לשימוש או 4 עטי מזרק מוכנים לשימוש.
ייתכן שלא כל גודלי האריזות מסווגים.
- בעל הרישום: גלקסוסמיטקלין (ישראל) בע"מ, רח' בזל 25, פתח תקווה.
- יצרכן: גלקסו אופריאנס אנגליה בע"מ, ברנרד קאסל, אנגליה.
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 161-25-35439
- לשם הפצתו ולהקלת הקיראה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

נערך במרץ 2024.

סימני מסחר הינט בעבולים או בזכיינות של קבוצת החברות של GSK.
© 2024 קבוצת החברות של GSK או הזכין שלה.

הוראות שלב אחר שלב להזרקה בעט המזרק המוכן לשימוש

פעם בשבוע

מלא אחר ההוראות שלහן המוחות כיצד להשתמש בצורה נכונה בעט מזרק מוכן לשימוש. אי-AMILIOI אחר ההוראות עלול להשפיע על תפקוד תקין של עט המזרק המוכן לשימוש. עליך גם לעבור הדרכה כיצד להשתמש בעט המזרק המוכן לשימוש. בנליסטה תת-עוררי 200 מ"ג מיועדת לשימוש **תת עוררי בלבד**.

אחסון

- יש לאחסן במקרר (בין 2°C ל-8°C).
- אין להקפיא.
- שמור באזית הקרטון כדי להגן מפני אור.
- יש להוציא מהקרר 30 דקות לפני השימוש.
- ניתן לאחסן את העט מזרק המוכן לשימוש בטמפרטורת החדר (עד 25°C) כשהוא מוגן מארור במשך 12 שעות לכל היותר. לאחר הוצאתו מהקרר **יש להשתמש בו תוך 12 שעות או להשליכו**.
- יש להרחק מהישג ידם וטווח ראייתם של ילדים.

אזהרות


- �ט המזרק המוכן לשימוש מיועד לשימוש חד-פעמי ויש להשליכו לאחר מכון.
- אין לחלוק את בנליסטה תת-עוררי 200 מ"ג עט מזרק מוכן לשימוש עם אדם אחר.
- אין לנער.
- אין להשתמש אם נפל על משטח קשה.
- אל תסיר את המכסה הטבעתי עד ממש לפני ההזרקה.

חלקי בנליסטה תת-עוררי 200 מ"ג עט מזרק מוכן לשימוש




מעצור אפור

מכסה טבעי



תאሪיך תפוגה

אביזרים הדרושים להזקה



בנלייטה תת-עוררי 200 מ"ג עט מזרק מוכן



מטלית אלכוהול
(לא כולל באירועה)



פְּד גָּזָה או צִמְר גַּפְן
(לא כולל באירועה)

1. אוסף ובודק את האביזרים אוסף אביזרים


- הוצא מהמקרר מגש אחד סגור של עט מזרק מוכן לשימוש.
- מצא משטח נוח, מואר היטב ונקי והנץ עלייו את האביזרים הבאים בהישג יד:
 - בנלייטה תת-עוררי 200 מ"ג עט מזרק מוכן לשימוש.
 - מטלית אלכוהול (לא כולל באירועה).

- פד גזזה או צמר גפן (לא כולל בארייזה).
- מכל ריק עם מכסה צמוד להשלכת העט המשומש (לא כולל בארייזה).
- אל תבצע את ההזרקה אם אין לך את כל האביזרים הרשומים מעלה.

בדוק את תאריך התפוגה

- קלף את הכיסוי של המגש והוא יצא את עט המזרק המוכן לשימוש.
- בדוק את תאריך התפוגה שלל עט המזרק המוכן לשימוש (ציפור 1).

ציפור 1



- אל תשתמש בתכשיר אם תאריך התפוגה עבר
- 2. הכן ובדוק את עט המזרק המוכן לשימוש יש לאפשר לעט המזרק להגיע לטמפרטורת החדר
 - הניח את העט בטמפרטורת החדר למשך 30 דקות (ציפור 2). הזרקה של עט בנלייטה תת-עוררי 200 מ"ג קר עלולה לקחת זמן ממושך יותר ועלולה להיות לא נוחה.

ציפור 2




- אל תחכם את העט בכל דרך אחרת. לדוגמה, אל תחכם במיקרוגל, במים חמים או באור שמש ישיר.
- אל תסיר את המכסה הטבעתי במהלך שלב זה.

בדוק את התמיסה של בnalista תת-עוררי 200 מ"ג

- הסתכל בחلون הבדיקה כדי לבדוק שתמיסת בnalista תת-עוררי 200 מ"ג היא נטולת צבע עד צהבהבה בצבעה (ציוויל 3).
- זה תקין לראותות בועת אוויר אחת או יותר בתמיסה.

ציוויל 3

תמייסת בnalista תת-עוררי 200 מ"ג




- אל תשתמש אם התמיסה נראהיה עכורה, בצבע שונה או אם יש בה חלקיקים.

3. בחר ונקה את אזור ההזרקה בחר את אזור ההזרקה

- בחר את אזור ההזרקה (בטן או ירך) כפי שניתנו לראותות בציוויל 4.

ציוויל 4




- אם אתה זקוק לשתי זריקות להשלמת המינון, השאר לפחות 5 ס"מ בין כל מקום ההזרקה אם אתה מזניק באותו אזור.
- אל תזריק בכל פעם בדיקות באותו האזור. זאת על מנת למנוע מהעור להתקשות.
- אל תזריק באזוריים בהם העור רגיש, פצוע, אדום או קשה.

- אל תזריק במרחק הקטן מ- 5 ס"מ מהטבור.

נקה את אזור ההזרקה

- רחץ את ידיך.
- נקה את אזור ההזרקה על ידי ניגובו במטלית אלכוהול (ציפור 5). הנה לעור להתייבש באוויר.

ציפור 5




- אל תיגע באזור זה שוב לפני מתן הזריקה.

4. התכוון להזרקה הסר את המכסה הטבעתי

- אל תסיר את המכסה הטבעתי עד ממש לפני ההזרקה.
- הסר את המכסה הטבעתי על ידי משיכה או סיבוב שלו. ניתן לסובב את המכסה הטבעתי עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון (ציפור 6).

ציפור 6




- אל תכסה בחזרה את העט עם המכסה הטבעתי.

מקם את העט

- אחיז בעט בנוחות כך שתוכל לצפות בחלון הבדיקה. זה חשוב כדי שתוכל לוודא מתן מינון מלא (ציפור 7).

ציפור 7




- במידת הצורך, משור או מתח את העור באזור ההזרקה כדי להפוך אותו למוצק יותר.
- מיקם את העט ישר מעל אזור ההזרקה (בזווית של 90 מעלות). ודא שמאן המחט המוחаб שטוח על-פני העור.

5. הזרק בנלייטה תה-עוררי 200 מ"ג התחל את ההזרקה

- לחץ את העט באופן יציב וחזק כל הדרך לתוך אזור ההזרקה והחזיק אותו במקום (ציפור 8).

פעולה זו תחדיר את המחט ותתחיל את ההזרקה.

ציפור 8



ייתכן שתשמעו "קליק" ראשון בתחילת ההזרקה. אתה תראה את המחוון (אינדיקטור) הסגול מתחילה לנوع דרך חלון הבדיקה (ציפור 9).


ציפור 6



שלם את הזרקה

המשך להחזיק את העט בכיוון מטה עד שהמחוון (אינדיקטור) הסגול יפסיק לנוע. ניתן תשמעו "קליק" שני כמה שניות לפני שהמחוון (אינדיקטור) הסגול מפסיק לנוע (ציוויל 10).

ציר 10



יתכו שהזרקה תימשך 15 שניות עד להשלמה.

- כאשר הזרקה הושלמה, הרם את העט מאזור הזרקה.

6. השלב ובודק

- אל תכסה בחזרה את העט עם המכסה הטבעתי.
 - השליך את העט המשומש והמכסה הטבעתי לתוך מכל ריק עם מכסה צמוד.
 - בקש מהרופא או מהרוקח הסבר כיצד להשליך כראוי עט משומש או מכל שבתווכו עטים משומשים.

- אל תמחזר או תשליך עט משומש, או מכל שבתוכו עטים משומשים, בפסולת ביתית.

בדוק את איזור ההזרקה

ויתכן שתהייה כמות קטנה של דם באיזור ההזרקה.

- במידת הצורך, לחץ צמר גפן או פד גזה על איזור ההזרקה.
- אל תשפssh את איזור ההזרקה.

Ben 200mg PT v6