

מספר לחיצות	מינון	שעת נטילת הפקפנט xx:xx	תאריך נטילת הפקפנט xx/xx/xxxx
1 / 2	100 / 400		
1 / 2	100 / 400		
1 / 2	100 / 400		
1 / 2	100 / 400		
1 / 2	100 / 400		
1 / 2	100 / 400		
1 / 2	100 / 400		
1 / 2	100 / 400		
1 / 2	100 / 400		
1 / 2	100 / 400		
1 / 2	100 / 400		
1 / 2	100 / 400		
1 / 2	100 / 400		
1 / 2	100 / 400		
1 / 2	100 / 400		
1 / 2	100 / 400		
1 / 2	100 / 400		
1 / 2	100 / 400		
1 / 2	100 / 400		
1 / 2	100 / 400		
1 / 2	100 / 400		
1 / 2	100 / 400		
1 / 2	100 / 400		

כיצד יש להיפטר מתרסיס פקפנט בסיום השימוש או שלא נעשה בו שימוש:

ניתן לראות מספר השונה מ- "8" בחלון למעקב מנות, סימן שלא השתמשת בכל 8 הלחיצות שבבקבוקון.

עליך לרוקן את המנות הנותרות של הפקפנט מהבקבוקון על ידי כיוון התרסיס בכיוון אחר ממך (ומאנשים אחרים) וביצוע לחיצות חוזרות עד להופעת מספר "8" בצבע אדום בחלון למעקב מנות.

- אין לעבור על המנה המומלצת או לשנות את המינון על דעת עצמך.
- ספר מיד לרופא אם אתה חווה מעל 4 אירועים של כאב מתפרץ ביום.
- אם אינך בטוח בנוגע למינון המתאים או בכמה לחיצות פקפנט להשתמש, פנה לרופא .

מומלץ לבצע מעקב כתוב של שעה ותאריך הנטילה של פקפנט, על מנת למנוע מינון יתר. לנוחיותך, להלן טבלת מעקב:

מספר לחיצות	מינון	שעת נטילת הפקפנט xx:xx	תאריך נטילת הפקפנט xx/xx/xxxx
1 / 2	100 / 400		
1 / 2	100 / 400		
1 / 2	100 / 400		
1 / 2	100 / 400		
1 / 2	100 / 400		
1 / 2	100 / 400		
1 / 2	100 / 400		
1 / 2	100 / 400		
1 / 2	100 / 400		
1 / 2	100 / 400		
1 / 2	100 / 400		
1 / 2	100 / 400		
1 / 2	100 / 400		
1 / 2	100 / 400		
1 / 2	100 / 400		
1 / 2	100 / 400		
1 / 2	100 / 400		
1 / 2	100 / 400		
1 / 2	100 / 400		
1 / 2	100 / 400		
1 / 2	100 / 400		
1 / 2	100 / 400		

הרופא רשם לך תרופה בשם פקפנט, המכילה את החומר הפעיל פנטניל. פקפנט מיועד לטיפול בחולי סרטן מבוגרים אשר סובלים מכאב מתפרץ. כאב מתפרץ הינו כאב אשר מופיע באופן פתאומי, אפילו כאשר המטופל נמצא תחת טיפול רגיל בתרופות אופיואידיות לשיכוך כאבים קבועים (כמו מורפין, פנטניל, אוקסיקודון או הידרומורפון). עליך לקרוא את הוראות השימוש המדויקות המצוינות בעלון לצרכן, על מנת להבטיח אופן שימוש נכון בתכשיר.

שים לב: בכל בקבוקון יש אפשרות ל- 8 לחיצות משחררות תרופה בלבד! **בכמה התזות יש להשתמש:**

- המנה לטיפול באירוע כאב מתפרץ יכולה להיות לחיצה אחת או שתי לחיצות (אחת בכל נחיר).
- הרופא ינחה אותך בכמה לחיצות (1 או 2) עליך להשתמש לטיפול באירוע כאב מתפרץ.
- אם הרופא הורה על מינון של שתי לחיצות, יש לבצע לחיצה אחת בכל נחיר ולא שתי לחיצות בנחיר אחד!!
- אל תשתמש מעבר למנה שהרופא רשם לכל אירוע בודד של כאב מתפרץ.
- אין להשתמש בפקפנט יותר מ- 4 פעמים ביום.
- המתן לפחות 4 שעות עד לשימוש במנה הבאה של פקפנט.